IMIDACLOPRID + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: NUPRID MAX.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridil -metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida.
tebuconazole: alfa-[2-(4-clorofenil)etil]-alfa-(1-1demetiletil)-1H-1,2,4triazol-1etanol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Bicho torito o Bicho candado (*Diloboderus abderus)* Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón cubierto del trigo (*Tilletia foetida)* Carbón volador (*Ustilago nuda f. sp. tritici)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Gorgojo del trigo (*Listronotus bonariensis)* Gorgojos (*Pantomorus spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano blanco (*Maecolaspis spp.)* Gusano blanco o Escarabajo rubio (*Cyclocephala signaticolis)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Pulgón ruso (*Diuraphis noxia)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)* Salta Perico (*Conoderus spp.)*	200 cm3/qm		La semilla a tratar debe estar previamente ventilada para eliminar todo resto de paja, polvo, etc. Debe tener buena energía germinativa y poder germinativo y se deben evitar las sobredosificaciones. El equipo a utilizar debe estar diseñado para tal fin o en su defecto puede utilizarse un tambor rotativo con eje excéntrico o una máquina tipo hormigonera, de manera tal de lograr un buen recubrimiento de las semillas. Aplicar la dosis recomendada diluida en 1,3 a 1,8 litros de agua cada 100 kg de semillas de tal forma que se logre un caldo total de 1,5 a 2 litros. Realizado esto y con el equipo en movimiento, volcar el caldo dentro del mismo hasta que se observe un buen recubrimiento de todas las semillas.

Información General:

Este curasemillas está compuesto por dos ingredientes activos: imidacloprid y tebuconazole, ambos de probada eficacia dada su acción sistémica y de contacto.

Modo de acción: la acción de imidacloprid se basa en una intervención en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso de los insectos. De manera análoga a cómo actúa la acetilcolina que es un transmisor químico natural de impulsos nerviosos, el imidacloprid excita ciertas células nerviosas, atacando una proteína receptora.
A diferencia de la acetilcolina, que puede ser desdoblada rápidamente por la enzima acetilcolinesterasa, el imidacloprid no puede ser desdoblado o bien ese proceso se desarrolla lentamente. El efecto prolongado del producto transforma el sistema nervioso de los insectos, ocasionándoles finalmente la muerte.
El mecanismo de acción del imidacloprid se diferencia tanto del de los ésteres del ácido fosfórico y de los carbamatos (ambos grupos y materias activas son inhibidores de la acetilcolinesterasa) como del de los piretroides, los cuales actúan sobre otras proteínas de la membrana de las fibras nerviosas.
El tebuconazole pertenece a la clase de los fungicidas azólicos. Estos interfieren en el metabolismo de los patógenos fungosos esencialmente como inhibidores de la biosíntesis de los esteroles, que son constituyentes de las membranas de los hongos. Sin los esteroles, la función de las membranas está perturbada, es decir, que el hongo tratado no puede desarrollarse.
Igual que los fungicidas azólicos tradicionales, tebuconazole interfiere en la biosíntesis de los ergosteroles, pero a diferencia de aquellos, actúa en más de un sitio de la biosíntesis del ergosterol.
La mezcla de imidacloprid + tebuconazole, reúne las cualidades de dichos ingredientes activos proveyéndole a la semilla la protección necesaria para una segura implantación del cultivo.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protección facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del principio activo imidacloprid:
DL 50 oral aguda en rata: > 450 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.

Del principio activo tebuconazole:
DL 50 oral aguda en rata: 4000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.

Verifique con la empresa los datos toxicológicos de este producto formulado.

Riesgos ambientales: producto altamente tóxico para abejas, aunque debido a su uso como curasemillas, no presenta riesgos para éstas. Muy tóxico para aves, aunque debido a su patrón de uso no presenta riesgos para éstas. Prácticamente no tóxico para peces y otros organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
NUPRID MAX	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA S.A.	35535	FS	23,3 + 1,3 %	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.