Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

IODOSULFURON METIL SODIO + METSULFURON METIL

Nomenclatura Química:
Iodosulfuron Metil Sodio: Methyl 4 iodo 2 [3 (4 methoxy - 6 - methyl - 1, 3, 5, triazun - 2 - yl) ureidosulfurfonyl] benzoate, sodium salt.
Metsulfuron Metil: Metil 2-[((((4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) amino) carbonil) amino) sulfonil] benzoato.
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Capiquí (*Stellaria media)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verónica (*Veronica arvensis)*	4 g/ha + 60 g/ha	60	Desde que el trigo tiene 2 hojas y cuando las malezas tengan un estado de desarrollo entre 1 y 4 hojas o con rosetas de hasta 5 cm. de diámetro (crucíferas) y las condiciones de humedad sean favorables. Agregar 200 cm3 de coadyuvante/100 l de agua.
	Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)*	5 g/ha + 75 g/ha		

Información General:

Es un herbicida post emergente de aplicación temprana en el cultivo de trigo (2 hojas en adelante) que actúa sin afectarlo y cuando las malezas producen el mayor daño por competencia. Es absorbido por el follaje y raíces de las malezas y se traslada a todos los órganos de éstas. Está compuesto por dos productos, separados en envases distintos (bolsas). La bolsa 1 contiene Iodosulfuron metil sodio al 5% y la bolsa 2 contiene metsulfuron metil al 60% que deben ser mezclados en el tanque de la pulverizadora en el momento de prepararlos para la aplicación.
Actúa produciendo un bloqueo de la síntesis de aminoácidos, inactivando la división celular. Además presenta un efecto residual que se prolonga por 2 ó 3 semanas, eliminando las nuevas camadas de malezas al momento de germinar, sin dejar residuos perjudiciales en el suelo.
Rotación de cultivos: dejar transcurrir 120 días entre la aplicación y la siembra de girasol y maíz y 90 días en el caso de soja.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente(Ej. Tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) ó 2 (WSSA) + B (HRAC) ó 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: 4533 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: 2/5 mg/l.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE