IPRODIONE

Marcas comerciales: IPPON 50 SC - ROVRAL - ROVRAL TS.

Nomenclatura Química:
iprodione: 1-isopropilcarbamoil-3-(3.5-diclorofenil)-hidantoina o 3-(3,5-diclorofenil)-N-isopropil-2,4-dioxoimidazolidina-1-carboxamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dicarboximida.
Acción: de contacto.

Uso: tratamiento de semillas (ROVRAL TS).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón	Mal del tallito del algodón (*Rhizoctonia solani)* Podredumbre de la semilla (*Pythium spp.)*	60 cm³/100 kg de semilla	Para lograr este control mezclar con 75 g de fosetil aluminio al 80% más 400 cm³ de tiram al 50%.
Cebada Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera spp.)*	100 cm³/100 kg de semilla	En presencia de carbones mezclar con triticonazole al 10% FS a la dosis recomendada en marbete.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Begonia	Podredumbres (*Sclerotinia spp.)* Podredumbres (*Botrytis spp.)*	2 g/m2 (en 5 l de agua)		Con el riego, después de la siembra.
Césped	Mancha en rueda del césped (*Sclerotinia spp.)* Mancha marrón del césped (*Rhizoctonia solani)*	40 - 60 g/100 m2		Aplicar desde la aparición de los primeros síntomas y repetir cada 10 - 15 días.
Clavel Gladiolo	Mancha gris del clavel (*Alternaria dianthicola)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Podredumbre gris del gladiolo (*Botrytis gladiolorum)*	En invernáculo: 100 g/hl de agua. En cultivos sin cubierta: 150 g/hl de agua.		Iniciar las aplicaciones a la aparición del botón floral y repetir cada 15 días.
	Podredumbres (*Sclerotinia spp.)* Podredumbres (*Botrytis spp.)*	2 g/m2 (en 5 l de agua)		Con el riego, después de la siembra.
Crisantemo Rosa	Mancha gris del clavel (*Alternaria dianthicola)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Podredumbre gris del gladiolo (*Botrytis gladiolorum)*	En invernáculo: 100 g/hl de agua. En cultivos sin cubierta: 150 g/hl de agua.		Iniciar las aplicaciones a la aparición del botón floral y repetir cada 15 días.
Durazno Nectarina	Hongos del suelo (*Botrytis spp.)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Podredumbres de los frutos (*Monilia spp.)*	100 g/hl agua		Post-cosecha: Por inmersión o aspersión inmediatamente después de la cosecha
Frutilla	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	100 g/hl (para un caudal de 2000 l/ha)	21	Hacer los tratamientos: 1) Comienzo de floración. 2) Plena floración. 3) Fin de floración. En caso de floración prolongada, es necesario efectuar 1 a 3 aplicaciones complementarias
Lechuga	Marchitamiento de las hortalizas (*Sclerotinia sclerotiorum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	1 kg/ha Caudal mínimo: 500 l/ha		Aplicar desde que el cultivo tenga 3 a 5 hojas. Repetir cada 10 - 15 días
Manzano	Moho azul de los frutales de pepita (*Penicillium expansum)* Podredumbres (*Botrytis spp)*	100 g/hl		Para manzanas de post cosecha se puede hacer la aplicación Drencher.
Papa	Sarna negra	350 - 400 g/hl (Papa cortada)		Al corte. Tiempo de inmersión: 10 - 15 minutos.

	(*Rhizoctonia solani)*			
		600 - 800 g/hl (Papa entera)		Antes de la plantación. Tiempo de inmersión: 10 - 15 minutos
Peras	Moho azul de los frutales de pepita (*Penicillium expansum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	100- 150 g/hl agua		Post-cosecha
Poroto	Mancha angular del poroto (*Phaeoisariopsis griseola)* Mancha grasienta (*Pseudomonas syringae)*	1 kg/ha	45	Iniciar los tratamientos a la aparición de los síntomas.
Vid	Podredumbre de los racimos (*Alternaria spp.)* Podredumbre de los racimos (*Botrytis spp.)* Podredumbre de los racimos (*Penicillum spp.)*	1,5 - 2 kg/ha	3	1) Fin de la floración. 2) Antes del cierre del racimo. 3) Al comienzo del envero. 4) Repetir cuando las condiciones predisponentes lo aconsejen.

Información General:

Iprodione actúa impidiendo la germinación de las esporas, o bloqueando el desarrollo del micelio.
Es altamente eficaz sobre numerosos hongos como son: Botrytis, Monilia, Helminthosporium, Penicillium y Sclerotinia.
No se absorbe por el follaje pero si es absorbido por las raíces e incorporado al suelo es rápidamente metabolizado.

Restricciones de uso: en el caso de aplicaciones foliares en geranio, crisantemo y begonia, no tratar hasta que las plantas posean 3-4 hojas promedio.
En caso de aplicaciones a semillas: exento.

Derrames:
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto, y disponer según tratamiento de remanentes. En caso de producto diluido en agua, adsorber con arena u otro material inerte, juntar el material en contenedores bien cerrados y etiquetados, para disponer como residuo de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable. Asegúrese de delimitar el derrame, evitando la contaminación del agua de riego y de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, protección facial respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda en ratas: > 2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg.

Del producto formulado al 50% WP:
DL 50 oral aguda en ratas: 12500 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: > 5 mg/l.

Antídoto: aplicar tratamiento sintomático.
Para más información, ver el capítulo "Emergencias Médicas por Productos Fitosanitarios".

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para aves y peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
IPPON 50 SC	UPL ARGENTINA S.A.	36118	SC	50%	III
ROVRAL	FMC	37738	WP	50%	IV
ROVRAL TS	FMC	33506	FS	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.