# KASUGAMICINA

**Marcas comerciales**: KASUMIN 2 (*).

**Nomenclatura Química:**
kasugamicina:[5-amino-2-metil-6-(2,3,4,5,6-pentahidroxiciclohexiloxi) tetrahidropiran-3-il]am ino-alfa-iminacético.
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** antibiótico.
**Acción:** sistémica, preventiva y curativa.

**Uso:** bactericida y fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Acelga<br>Remolacha | Viruela de la acelga y remolacha<br>(*Cercospora beticola)* | 250 cm3/hl | 1 | Al aparecer los primeros síntomas y repitiendo cada 10 días hasta la cosecha. |
| Apio | Viruela del apio<br>(*Cercospora apii)* | 1,5 - 3 l/ha | | Aplicar antes de floración (preventivo).<br>Cuando aparecen los primeros síntomas y repetir cada 7 - 10 días. |
| Arroz | Bruzzone parasitario<br>(*Magnaporthe grisea)* | 1 l/ha | 21 | Emplear un volumen de 150 a 300 l/ha de agua en aplicaciones terrestres, y de 15 a 30 l/ha de agua en aplicaciones aéreas. La dosis indicada puede duplicarse a 2 l/ha en aplicaciones terrestres o aéreas cuando el grado de ataque sea calificado como muy grave. |
| Cebolla<br>Papa<br>Repollo<br>Zanahoria | Podredumbre blanda de las hortalizas<br>(*Erwinia carotovora p.v. carotovora)* | 250 cm3/hl | 1 | Aplicar antes de la cosecha o con el agua de lavado en post-cosecha. |
| Cítricos o citrus | Cancrosis de los citrus<br>(*Xanthomonas campestris pv. citri)* | 300 cm3/hl | | Aplicar a partir de la primera brotación y luego en cada brotación sucesiva. |
| Florales | Marchitez bacteriana del clavel<br>(*Pseudomonas caryophylli)*<br>Podredumbre bacteriana del crisantemo<br>(*Erwinia chrysanthemi p.v. chrysanthemi)*<br>Podredumbre de los rizomas<br>(*Erwinia carotovora var. aroideae)*<br>Podredumbre del gladiolo<br>(*Pseudomonas gladioli)*<br>Podredumbre negra de las crucíferas<br>(*Xanthomonas campestris pv. campestris)* | 250 - 300 cm3/hl | | Preventivo cada 15 días o con los primeros síntomas. Repetir cada 7 días. |
| Peral | Bacteriosis<br>(*Pseudomonas syringae pv. syringae)* | 300 cm3/hl | | Aplicar a partir de plena floración y repetir a los 7 días. |
| Pimiento | Tizón temprano de la papa<br>(*Alternaria solani)* | 250 cm3/hl | | Pulverizar desde el trasplante y cada 10 días. |
| Tomate | Cancro bacteriano del tomate<br>(*Clavibacter michiganense)* | 2,5 l/ha (Fertirriego) | | Primera aplicación en el almácigo, la segunda al trasplante y luego con cada desbrote o helada. |
| | Tizón tardío de la papa<br>(*Phytophthora infestans)*<br>Tizón temprano de la papa<br>(*Alternaria solani)* | 250 cm3/hl | | Efectuar aplicaciones preventivas desde el trasplante y cada 10 días. |
| | Viruela del tomate<br>(*Septoria lycopersici)* | | | Primera pulverización en el almácigo, la segunda al trasplante y luego cada 10 días. |

**Información General:**

Propiedades físicas y químicas del principio activo: blanco cristalino (material estándar); polvo parduzco (grado técnico). Densidad de 0,4 a 0,6, de olor levemente aromático, soluble en agua (alrededor de 1 g/ml a temperatura ambiente), es insoluble en otros solventes orgánicos. Muy estable a temperatura ambiente y estable en ácidos débiles pero inestable en ácidos fuertes o alcalinos.
No posee características corrosivas; producto de disociación constante y punto de fusión de 202 - 204°C.
Estabilidad del producto: muy estable en condiciones de frio y ambiente seco.

Equipos de aplicación: no tiene recomendaciones especiales en cuanto a equipos de aplicación, pudiendo usar máquinas de bajo y/o alto volumen, siempre que garanticen una cobertura uniforme. Puede aplicarse en forma terrestre o aérea.

Caudal: en aplicaciones terrestres entre 150 y 200 l/ha. En aplicaciones aéreas no menos de 20 l/ha.
Tipo de pastilla: preferentemente del tipo cónico.

Presión: 50 - 80 lb/pulg2.
Número y tamaño de gotas: 70 - 100/cm2 de 100 - 200 micrones.

Condiciones y advertencias especiales: NO aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Compatibilidad: es miscible o compatible con todos los productos fitosanitarios excepto con los fuertemente alcalinos.

**Derrames:**
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.
El producto derramado no puede ser reutilizado.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 24 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Protección facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

**Información Toxicológica:**

Del principio activo:
DL 50 oral aguda en rata: >10000 mg/kg
DL 50 oral aguda en ratón: >5000 mg/kg
CL 50 inhalatoria aguda (4 hs.) para ratas: > 2,4 mg/l

Leve Irritante Ocular
Leve Irritante dermal.

Advertencia para el médico: categoría IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.

Antídoto: no tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| KASUMIN 2 (*) | UPL ARGENTINA S.A. | 31414 | EC | 2% | IV |

(*) Distribuido por S.ANDO Y CIA. S.A.C.I.I.F.

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**