LACTOFEN

Marcas comerciales: COBRA 24 EC - HUCK 24 EC.

Nomenclatura Química:
lactofen: 1-(carboetoxi) etil 5 [2-cloro-4-(triflurometil) fenoxi]-2 nitrobenzoato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: difenil éter.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maní	Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Nabo (*Brassica campestris)*	350 cm3/ha	40	El cultivo de Maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas. Para el control temprano de malezas en un estado de desarrollo entre 1 y 6 hojas.
	Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	250 cm3/ha		
	Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)	600-800 cm3/ha		Hasta 6 hojas y 10 cm de altura.
Soja	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Alkekenje (*Physalis angulata)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (**) (*Tagetes minuta)* Farolito (*Nicandra physaloides)* Flor de Santa Lucía (*) (*Commelina erecta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Nabo (*Brassica campestris)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado resistente a ALS (****) (*Amaranthus quitensis)*	350 cm3/ha	90	El cultivo de Soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas. Para el control temprano de malezas en un estado de desarrollo entre 1 y 6 hojas.
	Verdolaga (*Portulaca oleracea)*	250 cm3/ha		
	Yuyo colorado (***) (*Amaranthus hybridus)*	600-800 cm3/ha		Hasta 6 hojas y 10 cm de altura.
	Yuyo colorado (***) (*Amaranthus palmeri)*			Hasta 4 hojas y 5 cm de altura

(*) Se recomienda en mezcla con 800 cm3 de imazetapir al 10%
(**) Se recomienda en mezcla con 30 g/ha de clorimuron etil al 25%
(***) Se recomienda aplicar con el agregado de aceite vegetal metilado 1000 cm3/ha
(****) Lactofen demuestra control efectivo sobre Amaranthus quitensis resistente a ALS.
La dosis mayor para Amaranthus palmeri e hybridus en Soja, deberá aplicarse en el caso que la presencia de la maleza supere el 25% de la cobertura del entresurco o la llegada del producto se vea muy dificultada por la intercepción del cultivo

Información General:

Herbicida para ser aplicado solo o en mezcla, para el control temprano de malezas en un estado de desarrollo entre 1 y 6 hojas.
El cultivo de soja debe presentar 2 a 3 hojas trifoliadas.
El cultivo presenta muy buena tolerancia a lactofen. Bajo ciertas condiciones (altas dosis, poco desarrollo del cultivo, estrés hídrico) puede evidenciarse un leve bronceado de las hojas, que no afecta el posterior desarrollo del cultivo.
El cultivo de maní debe presentar al menos 5 hojas verdaderas.
Para mezclas de tanque con otros herbicidas, consulte con su asesor de Summit-Agro Argentina S. A.
Aplicar únicamente cuando las malezas y el cultivo se encuentren en activo crecimiento, con buena humedad del suelo.
No aplicar en presencia de rocío; con vientos superiores a 10 km/h, ni con altas temperaturas y ante la inminencia de una lluvia.
Lactofen no necesita el agregado de ningún coadyuvante.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN
Puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. No se requiere el agregado de coadyuvantes al caldo de pulverización ya que estos vienen incorporados en el producto formulado.
En equipos terrestres se recomienda la utilización de pastillas tipo abanico plano preferentemente con ángulo de 80 o 110 grados, una presión de entre 40 y 60 lb/pulg2 y un volumen de 120-150 l/ha. para lograr una cobertura completa y uniforme.
En aplicaciones aéreas se recomienda una presión máxima de 40 lb/pulg2 y un volumen no inferior a 20 l/ha.

RESTRICCIONES DE USO
No aplicar cuando las malezas excedan el tamaño indicado y/o se encuentren recubiertas de polvo o tierra que impidan su completo mojado.
Aplicar únicamente cuando las malezas y el cultivo se encuentren en activo crecimiento, con buena humedad de suelo.
No aplicar bajo condiciones de sequía o estrés hídrico prolongado y/o baja humedad relativa ambiente.
No aplicar en presencia de rocío. Esperar hasta que el mismo desparezca.
No aplicar con vientos superiores a los 10 km/h, ni con altas temperaturas.
No aplicar ante la inminencia de una lluvia. No obstante, si la precipitación ocurriera 30 minutos después de la aplicación, no interferirá con la eficacia del producto ya que es de absorción extremadamente rápida.

Período de carencia: Soja: 90 días, Maní: 40 días.

Ingreso al área tratada: 12 horas

Compatibilidad
No mezclar este producto con graminicidas, aceites vegetales o minerales. Se debe respetar un intervalo mínimo de 5 días entre aplicación de lactofen y los graminicidas post emergentes.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:
Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalación en rata: > 1,02 mg/l

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros Auxilios
En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.
En caso de ingestión: No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Dar atención médica de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta, y la ropa que hubiese tomado contacto con el producto, con abundante agua y jabón. Dar atención médica si la piel está irritada.
En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos, separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.
En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es virtualmente no tóxico para abejas.
Es prácticamente no tóxico para aves.
No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Efectos agudos sobre peces: CL50 (96h): 0,1 mg/L (*)
Toxicidad para aves: DL50: ligeramente tóxico. (*)

(*) Para producto HUCK 24 EC

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COBRA 24 EC	BAYER	31763	EC	24%	III
HUCK 24 EC	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	37792	EC	24%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.