# LAMBDACIALOTRINA

**Marcas comerciales**: ADAMA ESSENTIALS LAMDEX - CENTINEL CS - CENTINEL 25 - FIGHTERXTRA - HAKA - KAISO SORBIE - KARATE CON TECNOLOGIA ZEON - KARATE ZEON 5 CS - KENDO - KENDO GOLD - MALEVO - MALEVO PLUS - OBULUS - PULSAR GOLD.

**Nomenclatura Química:**
lamdbacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del- alfa-ciano-3-fenoxibencil-cis-3-(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
**Clasificación Química:** piretroide.
**Acción:** de contacto e ingestión.

**Uso:** insecticida.

| Cultivo | Adversidad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* | PC 24% WG y 25% CS: 10 - 15 cm3/ha<br>PC 5% CS: 50 - 70 cm3/ha<br>PC 5% EC: 50 - 75 cm3/ha | 1 | Cuando se observen 4 - 5 isocas/m2 de cultivo o 30 - 50 isocas por cada 20 golpes de red.<br>La dosis a usar variará según el desarrollo del alfalfar y/o la intensidad de la infestación. |
| Algodón | Chinche rayada (*Horcias nobilellus)* | PC 5% CS: 85 cm3/ha | 5 | Cuando se observe una chinche cada 4 plantas. Repetir cuando haya reinfestación. |
| | | PC 25% CS: 17 cm3/ha (****) | | Cuando se observen 20 orugas/100 plantas o el 10% de peras y capullos atacados. (****) |
| | Oruga capullera (*Heliothis spp.)* | PC 24% WG y 25% CS: 75 - 100 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 375 - 500 cm3/ha | | Cuando se observen un 20% de plantas con presencia de orugas menores de 6 mm. o con 10% de plantas con orugas mayores de 6 mm. En cultivos más desarrollados usar siempre mezclas con otros insecticidas. Usar la dosis menor con más del 50% de larvas de menos de 6 mm y la dosis mayor con más de 50% de larvas de 6 - 12 mm. Evitar aplicaciones con orugas grandes (mayores de 12 mm). Las dosis de marbete indicadas sólo controlan los 3 primeros estadios de la plaga (Res. 495/96. IASCAV). |
| | Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)* | PC 24% WG y 25% CS: 75 - 100 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 375 - 500 cm3/ha | | Cuando se observen un promedio de 3 orugas por planta y las plantas no superen los 0,75 m de altura. En cultivos más desarrollados usar siempre mezclas con otros insecticidas. Usar la dosis menor con más del 50% de larvas de menos de 6 mm y la dosis mayor con más de 50% de larvas de 6 - 12 mm. Evitar aplicaciones con orugas grandes (mayores de 12 mm). Las dosis de marbete indicadas sólo controlan los 3 primeros estadios de la plaga (Res. 495/96. IASCAV). |
| Berenjena (***)<br>Pimiento (***) | Polilla del tomate (*Scrobipalpuloides absolutus)*<br>Polilla del tomate (*Tuta absoluta)* | PC 24% WG y 25% CS: 17 cm3/hl<br>PC 5% EC: 85 cm3/hl | 1 | Realizar aplicaciones al momento de vuelo de adultos. Se recomienda no realizar más de tres aplicaciones en la campaña, alternando y/o complementando con productos de otro modo de acción. |
| Durazno | Polilla del duraznero (*Grapholita molesta)* | PC 24 % WG: 4 g/hl<br>PC 25% CS: 4 cm3/hl<br>PC 5% CS y EC: 20 cm3/hl | | Pulverizar según las indicaciones del Servicio de Alarma (INTA) o particular (trampas de feromonas). Para este último caso aplicar dentro de los 7 días siguientes a la caída de 15 mariposas por trampa. Si no existen servicios de monitoreo, pulverizar cada 15 a 20 días después de la caída de los pétalos hasta 15 días antes de la cosecha.<br>Controlar la evolución de la población de arañuelas e intervenir con un acaricida (ovicida o adulticida) cuando sea necesario. |
| Girasol | Gusanos cortadores, Orugas cortadoras o grasientas (*Agrotis spp.)* | PC 24% WG y 25% CS: 20 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 100 cm3/ha | 5 | Antes o después de la emergencia del cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Aplicación en post emergencia, cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 25 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 125 cm3/ha | | Antes de sembrar el cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* | PC 24% WG y 25% CS: 35 cm3/ha<br>PC 5% CS: 170 cm3/ha | | Cuando se observen 3 isocas por planta. Lograr una buena penetración en todo el follaje del cultivo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PC 5% EC: 175 cm3/ha | | |
| | Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* | PC 24% WG: 25 cm3/ha<br>PC 25% CS: 17 - 27 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 85 - 135 cm3/ha | | Cuando se observen los primeros ataques. Usar la dosis menor en cultivos que no superen los 50 cm de altura. |
| Maíz | Barrenador del tallo (*Diatraea saccharalis)* | PC 24% WG y 25% CS: 66 cm3/ha<br>PC 5% EC: 330 cm3/ha | (*) | Aplicar al nacimiento de las larvas provenientes de huevos depositados en el pico de oviposición. Se recomienda el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo para realizar el seguimiento de la plaga. |
| | Chicharrita (*Delphacodes kuscheli)* | PC 24% WG y 25% CS: 35 cm3/ha<br>PC 5% CS: 170 cm3/ha<br>PC 5% EC: 175 cm3/ha | | Emergencia del coleoptile y repetir la misma dosis a los 5 días. |
| | Gusanos cortadores, Orugas cortadoras o grasientas (*Agrotis spp.)* | PC 24% WG y 25% CS: 20 cm3/ha<br>PC 5% CS: 100 cm3/ha | | Antes o después de la emergencia del cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Aplicación en post emergencia, cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 25 cm3/ha<br>PC 5% CS: 125 cm3/ha | | Antes de sembrar el cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | Isoca de la espiga (*Heliothis zea)* | PC 24% WG y 25% CS: 50 cm3/ha<br>PC 5% EC: 250 cm3/ha | | Con sistema de monitoreo, aplicar al observarse deposición de huevos en los estigmas. Preventivamente realizar una aplicación al aparecer las barbas y continuar con aplicaciones con intervalos de 3 días hasta senescencia de estigmas. |
| | Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda)* | PC 24% WG y 25% CS: 35 - 50 cm3/ha<br>PC 5% EC: 175 - 250 cm3/ha | | Aplicar en presencia de las primeras hojas raspadas. En caso de zona endémica, repetir las aplicaciones semanalmente. Con cultivos de menos de seis hojas, recurrir a la dosis inferior y emplear dosis más altas con cultivos de mayor tamaño. |
| Manzano | Bicho de cesto (*Oiketicus kirbyi)*<br>Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)* | PC 24% WG y 25% CS: 4 cm3/hl<br>PC 5% CS y EC: 20 cm3/hl | 1 | Pulverizar según las indicaciones del Servicio de Alarma (INTA) o particular (trampas de feromonas). Para este último caso aplicar dentro de los 7 días siguientes a la caída de 10 mariposas diarias por trampa. Si no existen servicios de monitoreo pulverizar cada 15 - 20 días después de la caída de dos tercios de los pétalos hasta 15 días antes de la cosecha. Controlar la evolución de la población de arañuelas e intervenir con un acaricida (ovicida o adulticida) cuando sea necesario. Repetir cuando haya re-infestación. |
| Nogal | Polilla de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)*<br>Polillas (*Amyelois transitella)*<br>Polillas (*Ectomyelois ceratoniae)* | | | Pulverizar según las indicaciones del Servicio de Alarma (INTA) o particular (trampas de feromonas). Si no existen servicios de monitoreo pulverizar cada 15 - 20 días después de la caída de los pétalos hasta 15 días antes de la cosecha. Controlar la evolución de la población de arañuelas e intervenir con un acaricida (ovicida o adulticida) cuando sea necesario.<br>(**)Repetir cuando haya re-infestación. |
| Papa (***) | Minador de la hoja (*Liriomyza spp.)* | PC 25% CS: 50 cm3/ha | 30 | Aplicar cuando la población de adultos supere los 200 adultos por trampa y haya menos de 2 galerías chicas por planta. Usar como primer producto en la rotación. Actúa exclusivamente sobre los adultos. Como consecuencia, es fundamental realizar la aplicación con una alta presencia de los mismos, complementándolo luego con la aplicación de abamectina 1.8%, de acuerdo a las recomendaciones del marbete. |
| Peral | Bicho de cesto (*Oiketicus kirbyi)*<br>Gusano de la pera y la manzana, Carpocapsa (*Cydia pomonella)* | PC 24% WG y 25% CS: 4 cm3/hl<br>PC 5% CS y EC: 20 cm3/hl | 1 | Cuando se observen las primeras larvas.<br>(**)Pulverizar según las indicaciones del Servicio de Alarma (INTA) o particular (trampas de feromonas). Para este último caso aplicar dentro de los 7 días siguientes a la caída de 10 mariposas diarias por trampa. Si no existen servicios de monitoreo pulverizar cada 15 - 20 días después de la caída de dos tercios de los pétalos hasta 15 días antes de la cosecha. Controlar la evolución de la población de arañuelas e intervenir con un acaricida (ovicida o adulticida) cuando sea necesario. Repetir cuando haya re-infestación. |
| | Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)* | | | Cuando se observen ninfas y sea notoria la secreción de la melaza. Repetir a la caída de los pétalos. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Soja | Barrenador del brote (*Epinotia aporema)* | PC 24% WG y 25% CS: 20 cm3/ha + 600 - 750 cm3/ha de clorpirifos 48%.<br>PC 5% EC: 100 + 600 - 750 cm3/ha de clorpirifos 48%. | 5 | A partir de floración al observarse los 1ros. daños en flores y vainas. Mezclar la dosis indicada con 600 - 750 cm3/ha de clorpirifos 48%. Utilizar la dosis más alta de clorpirifos cuando se observe un 20 - 30% de brotes atacados. Con ataques más leves utilizar la dosis menor. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 27 cm3/ha (***)<br>PC 5% CS y EC: 135 cm3/ha | | Antes de floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 35 cm3/ha (***)<br>PC 5% EC: 175 cm3/ha | | Después de floración, cuando se observen 10 a 15 orugas por metro lineal de cultivo o 10% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar. |
| | Chinche verde (*Nezara viridula)* (***) | PC 24% WG y 25% CS: 17 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 85 cm3/ha | | Al comienzo de floración (tratamiento preventivo) o cuando se observen hasta 2 chinches por metro lineal de cultivo. Dosis para cultivo abierto o de escaso follaje. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 25 cm3/ha<br>PC 5% CS: 120 cm3/ha<br>PC 5% EC: 125 cm3/ha | | Cuando se observen más de dos chinches por metro lineal de cultivo. Dosis para cultivo muy cerrado o abundante follaje. Lograr una buena penetración en todo el follaje del cultivo. |
| | Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* | PC 24% WG y 25% CS: 15 - 20 cm3/ha<br>PC 5% CS: 75 - 100 cm3/ha<br>PC 5% EC: 75 - 95 cm3/ha<br>PC 5% EC: 75 - 100 cm3/ha (**) | | Cuando se observen 15 a 20 orugas o isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20% de daño foliar.<br>Usar la dosis menor cuando las plantas son aún pequeñas. |
| | Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* | PC 24% WG y 25% CS: 27 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 135 cm3/ha | | Antes de floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 35 cm3/ha<br>PC 5% EC: 175 cm3/ha | | Después de floración, cuando se observen 10 a 15 orugas por metro lineal de cultivo o 10% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar. |
| | Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)* | PC 24% WG: 15 – 20 cm3/ha<br>PC 25% CS: 15 – 20 cm3/ha<br>PC 25% CS: 17 - 27 cm3/ha (**)<br>PC 5% EC: 75 - 100 cm3/ha (**)<br>PC 5% CS: 75 - 95 cm3/ha | | Cuando se observen 15 a 20 orugas o isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20% de daño foliar.<br>Usar la dosis menor cuando las plantas son aún pequeñas. |
| Sorgo granífero | Gusanos cortadores, Orugas cortadoras o grasientas (*Agrotis spp.)* | PC 24% WG y 25% CS: 20 - 25 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 100 cm3/ha | | Antes o después de la emergencia del cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Aplicación en post emergencia, cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | | PC 24% WG y 25% CS: 25 cm3/ha<br>PC 5% CS y EC: 125 cm3/ha | | Antes de sembrar el cultivo. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. |
| | Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)* | PC 25% CS: 35 cm3/ha<br>PC 5% CS: 170 cm3/ha<br>PC 5% EC: 175 cm3/ha | | Cuando haya una mosquita promedio por panoja comenzando con 90% de panojamiento y 10% de floración. Repetir a los 7 días con floración prolongada o alta infestación de la plaga. |
| | Oruga militar tardía | PC 25% CS: 17 - 28 cm3/ha | | Cuando se observen los primeros ataques. Usar la dosis menor en cultivos que no superen los 50 cm de altura. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (*Spodoptera frugiperda)* | PC 5% CS y EC: 85 - 135 cm3/ha | | |
| Tabaco (***) | Oruga capullera, Oruga cogollera (*Heliothis spp.)* | PC 24% WG y 25% CS: 30 cm3/ha o 5 cm3/hl | 30 | Al detectar las primeras orugas menores de 10 mm |
| Tomate | Polilla del tomate (***) (*Scrobipalpuloides absolutus)* Polilla del tomate (*Tuta absoluta)* | PC 24% WG y 25% CS: 17 cm3/hl PC 5% CS y EC: 85 cm3/hl | 1 | Cuando se observen los primeros ataques después del trasplante. Repetir cada 7 a 14 días de acuerdo al grado de infestación y a la rapidez de crecimiento del cultivo. |
| Trigo (***) | Oruga desgranadora (*Faronta albilinea)* | PC 25% CS: 35 - 50 cm3/ha | 25 | Preventivo: sobre la hoja bandera desplegada Con plaga presente: al observarse los primeros ataques. En aplicación aérea emplear volúmenes superiores a 6 l/ha, asegurando al menos 50 impactos/cm2. |
| | | PC 5% EC: 250 cm3/ha | | Preventivo: sobre la hoja bandera desplegada Con plaga presente: al observarse los primeros ataques. En aplicación aérea emplear volúmenes superiores a 6 l/ha, asegurando al menos 50 impactos/cm2. |
| | Oruga militar verdadera (*Pseudaletia adultera)* | PC 25% CS: 35 - 50 cm3/ha | | Preventivo: sobre la hoja bandera desplegada Con plaga presente: al observarse los primeros ataques. En aplicación aérea emplear volúmenes superiores a 6 l/ha, asegurando al menos 50 impactos/cm2. |
| Cítricos (***) | Psilido (Diaphorina citri) | PC 5% CS: 60 cm3/1 hl de agua PC 25% CS: 12 cm3/ha | 21 | Aplicar al observar las larvas de primer estadio sobre brotes tiernos morados, recién formados (3 a 5 cm de longitud). |

(*) Maíz dulce: 3 días; Maíz grano: 5 días.
(**) Dosis para los productos de Syngenta
(***) No recomendado en el producto de Corteva Agriscience Argentina SRL
(****) Para el producto de Corteva Agriscience Argentina SRL

**Información General:**

Insecticida piretroide de amplio espectro, que actúa especialmente sobre larvas de Lepidópteros, presentando actividad ovicida y adulticida. Se caracteriza por su buen poder de volteo, residualidad y propiedades repelentes, actuando sobre las plagas por contacto e ingestión, y siendo muy activo a bajas dosis. Actúa sobre el sistema nervioso del insecto, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente su muerte. Produce el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos principalmente por modificar la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los iones sodio.

Preparación: presentado como suspensión de encapsulado (CS) o como concentrado emulsionable en agua (EC).
Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Corroborar que el producto se mezcle completamente con el agua.
- Terminar de completar con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Para la formulación CS 25% puede aplicarse con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 l/ha y una presión de 40-50 lb/pulg2 (Utilizar la dosis mayor para superficies cerosas o pubescentes). También puede aplicarse con equipos aéreos, empleando un volumen mínimo de agua de 10 l/ha. La formulación CS 5% emplea un volumen de 5-8 l/ha, según el cultivo a tratar. La formulación EC (concentrado emulsionable) es compatible con gasoil en aplicaciones aéreas. No usar la formulación CS (suspensión de encapsulado) en aplicaciones aéreas con gasoil. En cultivos frutales, debe aplicar con equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Para la formulación CS 25% en papa se debe utilizar pulverizadoras de arrastre con un volumen de 400 litros/ha de agua y en tabaco un volumen de 600 litros/ha de agua.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
No utilizar en aplicaciones aéreas con gas oil.
Se recomienda utilizar 50-70 gotas/cm2

Aditivos: debe aplicarse junto a un humectante no iónico para lograr una buena emulsión y aumentar la eficiencia del tratamiento. En cultivos extensivos, usar una dosis 25-50 cm3 de humectante no iónico cada 100 litros de agua y en cultivos frutales una dosis de 5-20 cm3/100 litros de agua, correspondiendo la concentración menor a aplicaciones de alto volumen. Emplear la dosis mayor en superficies pubescentes o cerosas.

Recomendaciones de uso:
Cuando el cultivo sea atacado simultáneamente por distintos insectos, usar la dosis correspondiente a la especie que requiere mayor cantidad de producto.
Cuando el follaje sea muy denso o haya un alto grado de ataque, utilizar la dosis mayor recomendada para la plaga.
En condiciones de altas temperaturas y baja humedad relativa se requerirán dosis mayores para un buen control de la plaga.

Período de carencia:
Se deben dejar transcurrir los siguientes tiempos entre la última aplicación y la cosecha o pastoreo del cultivo: tabaco y papa: 30 días; trigo: 25 días; soja, sorgo granífero, girasol, algodón y maíz (grano): 5 días; maíz dulce: 3 días; manzano, peral, duraznero, nogal, tomate, pimiento y berenjena: 1 día. Cítricos: 21 días. En alfalfa y sorgo forrajero deberá transcurrir 1 día entre la aplicación y el pastoreo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Restricciones de uso:
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 hs (*)
(*) Producto de Corteva Agriscience Argentina SRL

Compatibilidad:
Compatible con fomesafen, fluazifop- butil, butirato + atrazina, flurocloridona, trifluralina, y atrazina, pirimifos metil y clorpirifos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.
En caso de realizar mezclas, colocar inicialmente las formulaciones en polvo o granulares y esperar hasta su total dispersión, luego las formulaciones de suspensión concentrada, los concentrados emulsionables y los líquidos solubles, siguiendo ese orden. Al finalizar la mezcla se agregará el humectante. No obstante, para mayor seguridad, leer las recomendaciones del producto con el cual se lo quiere mezclar y ensayar previamente la mezcla en pequeña escala. No es compatible con productos fuertemente alcalinos tales como caldo bordelés y polisulfuro de calcio. La formulación EC (concentrado emulsionable) es compatible con gasoil en aplicaciones aéreas. No usar la formulación CS (suspensión de encapsulado) en aplicaciones aéreas con gasoil.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

**Derrames:**
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 3A (IRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar indumentaria protectora adecuada, antiparras, barbijo, guantes impermeables, pantalón, camisa de manga larga y botas de goma.

**Información Toxicológica:**

PC 25% CS:
DL 50 oral aguda: >180 mg/kg (rata hembras) >245 mg/kg (ratas machos)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejos)
DL 50 inhalatoria aguda: 3,12 mg/l (ratas hembra); 3,72 mg/L (ratas macho)

Moderado irritante ocular. Leve (*)/Moderado irritante dermal. No sensibilizante (*)/Sensibilizante dermal.
El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
Síntomas de intoxicación aguda: Náuseas, vómitos, dolor de estómago, diarrea, irritación pulmonar, dermatitis. Si se ingiere en grandes cantidades puede causar temblores, ataxia y convulsiones.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación. Tratamiento sugerido: en caso de ingestión efectuar lavaje gástrico, evitando la aspiración.
(*) del Producto de Corteva Agriscience Argentina SRL.

PC 25% CS PULSAR GOLD:
DL 50 oral aguda: >117 mg/kg (rata hembras) >245 mg/kg (ratas machos)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejos)
DL 50 inhalatoria aguda: 2.522 mg/l (ratas hembra); 3,72 mg/L (ratas macho)

Clase toxicológica (OMS 2009): II – PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. Categoría Inhalatoria III (CUIDADO). LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV. MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático. Grupo químico: Piretroide.
Aves: Producto ligeramente tóxico
Abejas: Producto altamente tóxico
Peces: Producto extremadamente tóxico

PC 25% CS CENTINEL CS:
DL 50 oral aguda: >500 a 2000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 1000 mg/kg (rata)
CL 50 inhalatoria aguda: >1,5 mg/l (ratas hembra)

Irritacion ocular: No irritante.
Irritacion dermal: No irritante.
Sensibilización dermal: No Sensibilizante.

PC 24% WG:
DL 50 oral aguda: 310 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: >5000 mg/kg (rata)
LC50: No se establece categoría

Moderado irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación. Tratamiento sugerido: en caso de ingestión efectuar lavaje gástrico, evitando la aspiración.

PC 5% CS:
DL 50 oral aguda: >512 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata)

Moderado irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación. Tratamiento sugerido: en caso de ingestión efectuar lavaje gástrico, evitando la aspiración.

PC 5% EC:
DL 50 oral aguda: >500 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: >2000 mg/kg (rata)
LC50: 4,2 mg/m3.

Moderado irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación.
Tratamiento sugerido: En caso de ingestión efectuar lavaje gástrico, evitando la aspiración.
Síntomas de intoxicación aguda: El contacto con la piel puede producir sensación de hormigueo, pinchazos, quemazón o picazón (parestesia), que podría comenzar hasta 4 horas después del contacto y persistir de 2 a 30 horas, sin daño de la piel. Lave con agua y jabón neutro y use cremas oleosas en la piel afectada para aliviar esas sensaciones.

Leve irritante dermal. Severo irritante ocular.
No se conoce antídoto específico. Proseguir con tratamiento sintomático y de recuperación. Tratamiento sugerido: en caso de ingestión efectuar lavaje gástrico, evitando la aspiración.

Riesgos ambientales:
PC 25% CS: Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
PC 24 % WG: Extremadamente tóxico para peces.
PC 5% CS: Muy tóxico para peces.
PC 5% EC: Extremadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una franja de seguridad entre el área a tratar y el agua en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar estanques ni cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
NO aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de 10 metros entre cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución.

PC 25% CS: Altamente tóxico para abejas.
PC 24 % WG: Altamente tóxico para abejas.
PC 5% CS: Altamente tóxico para abejas.
PC 5% EC: Altamente tóxico para abejas.
Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no pudieran retirarse, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación , retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación aérea en las horas de mayor actividad de las abejas. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

PC 25% CS: Moderada toxicidad para mamíferos y prácticamente no tóxico para aves.
PC 24% WG: Ligeramente tóxico para aves.
PC 5% CS: Prácticamente no tóxico para aves.
PC 5% EC: Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la presencia de animales en el área de aplicación. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMA ESSENTIALS LAMDEX | ADAMA ARGENTINA SA | 34502 | EC | 5% | II |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTINEL CS | ATANOR S.C.A | 38426 | CS | 25% | II |
| CENTINEL 25 | ATANOR S.C.A | 37262 | CS | 25% | II |
| FIGHTERXTRA | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 40544 | CS | 25% | III |
| HAKA | INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. | 36680 | CS | 25% | II |
| KAISO SORBIE | NUFARM S.A. | 35321 | WG | 24% | II |
| KARATE CON TECNOLOGIA ZEON | SYNGENTA AGRO | 33310 | CS | 25% | II |
| KARATE ZEON 5 CS | SYNGENTA AGRO | 33650 | CS | 5% | II |
| KENDO | SYNGENTA AGRO | 34447 | EC | 5% | II |
| KENDO GOLD | SYNGENTA AGRO | 38061 | CS | 25% | II |
| MALEVO | SYNGENTA AGRO | 34648 | EC | 5% | II |
| MALEVO PLUS | SYNGENTA AGRO | 38060 | CS | 25% | II |
| OBULUS | ROTAM | 36090 | EC | 5% | II |
| PULSAR GOLD | UPL ARGENTINA S.A. | 38601 | CS | 25% | II |