LINURON

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIAL LINUREX - ADAMA ESSENTIALS LINURON 50 FW.

Nomenclatura Química:
linurón: 3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-metil-urea.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: urea.
Acción: de contacto y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Altamisa (*Ambrosia tenuifolia)* Azulejo (*Centaurea cyanus)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Cachiyuyos (*Atriplex montevidensis)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo ruso (*Salsola kali*) Carraspique (*Thlaspi arvense)* Cebadilla (*Bromus spp.)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Chamico (*Datura ferox)* Colas de zorro (*Setaria glauca)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Estramonio (*Datura stramonium)* Flor de pajarito (*Fumaria officinalis)* Lecheron (*Euphorbia spp.*) Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago spp.)* Malva (*Malva parviflora)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Margarita *(Chrysanthemun spp)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Meona, Yerba meona (*Euphorbia spp.)* Morenita (*Kochia scoparia)* Mostaza silvestre (*Sinapis arvensis)* Nabo (*Brassica spp.)* No me olvides	1,5 - 2,0 l/ha	En preemergencia: inmediatamente después de la plantación y antes de la emergencia del cultivo. En postemergencia: 15 a 20 días después que las plantitas hayan nacido y estén bien arraigadas, o en su defecto cuando hayan alcanzado los 10 cm de altura.
Apio			En postemergencia: 15 días después del trasplante.
Arveja o alverja		2,0 - 2,5 l/ha	En preemergencia: después de la siembra y antes que el cultivo germine.
Banano o plátano		2,0 - 3,0 l/ha	En plantaciones jóvenes y establecidas, aplicación dirigida sin mojar el follaje y después de un desmalezado mecánico o cuando las malezas no tengan más de 4 a 6 hojas verdaderas.
Batata o boniato		20 - 30 cm3/100 m2	Dosis para tratamiento de almácigos. Aplicar en preemergencia, después de tener al almácigo listo y antes de cubrirlo con polietileno usando un volumen de 10 litros de agua por cada 100 m2 de almácigo.
Caña de azúcar		4,0 - 6,0 l/ha	En preemergencia: En caña planta aplicación inmediata después de la siembra. En caña soca aplicar antes que emerjan los primeros brotes. En postemergencia: pulverización dirigida a ambos lados del surco sin mojar el follaje del cultivo y después de un desmalezado mecánico. En caso que no se haya efectuado, las malezas no deben tener más de 4 a 6 hojas verdaderas. Puede usarse en mezcla con herbicidas derivados de los ácidos 2,4 D y MCPA.
Cebolla		1,0 - 1,5 l/ha	Cultivos de trasplante: 1,2 a 1,5 L/ha. En postemergencia, 15 a 20 días después del trasplante, cuando las plantitas estén bien arraigadas pero antes que las malezas germinen. Cultivos de siembra directa: 1 a 1,5 kg/ha. En postemergencia, cuando las plantitas tengan por lo menos 3 hojas y luego de una carpida o escardillada manual.
Cítricos o citrus Pomelos, Limoneros, Naranjos y Mandarinos		2,0 - 6,0 l/ha	Aplicación dirigida a partir del tercer año de plantación, evitando mojar el follaje del cultivo y después de un desmalezado mecánico o cuando las malezas no tengan más de 4 a 6 hojas verdaderas.
Espárrago		2,0 - 2,5 l/ha	En preemergencia: aplicar en invierno contra malezas anuales y antes de que emerja el cultivo.
Frutales de carozo Durazneros Frutales de pepita Perales y Manzanos		2,0 - 4,0 l/ha	Aplicación dirigida a partir del tercer año de plantación, evitando mojar el follaje del cultivo y después de un desmalezado mecánico o cuando las malezas no tengan más de 4 a 6 hojas verdaderas.
Gladiolo		1,5 - 2,0 l/ha	En preemergencia: aplicar inmediatamente después de la plantación de los bulbos.
Maíz		2,0 - 3,0 l/ha	En preemergencia: 2 a 3 L/ha, inmediatamente después de la siembra del cultivo y antes de su emergencia. En postemergencia: 2 a 2,5 L/ha, aplicación dirigida, sin mojar el follaje del cultivo, cuando éste tenga 30 cm de altura y las malezas 10 cm, evitando mojar el follaje de maíz dulce. Es aconsejable en este caso realizar tratamientos en banda. El herbicida actúa mejor con el agregado de coadyuvantes.
Papa			En preemergencia, inmediatamente después de la siembra del cultivo, o en su defecto luego de un aporque, pero antes de la emergencia del cultivo.
Perejil		1,5 - 2,0 l/ha	En postemergencia: aplicar después de la aparición de la segunda hoja verdadera.
Poroto Soja			En pre emergencia: inmediatamente después de la siembra del cultivo y antes de su emergencia. Aplicar de manera uniforme

	(*Anagallis arvensis)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto de invierno, Poa (Poa annua) Pasto miel (*Paspalum dilatatum)* Pasto morado (*Leptochlora filiformis)* Pasto pelillo (*Eragrostis lugens)* Pega-pega (*Galium aparine*) Pensamiento salvaje *(Viola tricolor)* Perejilillo *(Bowlesia incana)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Polygonum persicaria (*Polygonum persicaria)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Quínoa negra (*Chenopodium murale)* Rabizón (*Raphanus raphanistrum)* Roseta francesa (*Tribulus terrestris)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Senecio (*Senecio vulgaris)* Sorgo de alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Spergula (*Spergula arvensis)* Valda (*Flaveria bidentis)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Vicias (*Vicia spp.)* Vinagrillo (*Rumex acetosella)* Vira vira (*Gnaphalium gaudichaudianum)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*		después de una lluvia o riego, y una vez que el suelo esté oreado.
Puerro			En postemergencia: 15 días después del transplante y luego que las plantitas estén bien arraigadas.
Vid		3,0 - 4,0 l/ha	En postemergencia: aplicación dirigida sin mojar el follaje del cultivo. Aplicar de manera uniforme, después de una lluvia o un riego y una vez que el suelo esté oreado.
Zanahoria		1,0 - 2,0 l/ha	En preemergencia: 1 L/ha, inmediatamente después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo. En postemergencia: 1,5 a 2 L/ha, aplicar una vez que el cultivo tenga 3 hojas verdaderas. Mientras dure la emergencia de las nuevas plantas no debe usarse este producto.

Información General:

Es un herbicida selectivo que se aplica en un gran número de cultivos, para el control simultáneo de malezas de hoja ancha y de hoja angosta (pastos y gramíneas), después de la siembra y antes de la germinación del cultivo (herbicida de premergencia) o cuando las plantas del cultivo y las malezas han aparecido sobre la superficie del suelo (herbicida de postemergencia). No controla las malezas de raíces profundas o las rizomatosas. ADAMA ESSENTIALS Linurex penetra en la planta a través de las hojas y las raíces. Para que se desarrolle esta doble acción el suelo debe tener un grado conveniente de humedad. Se fija en las capas superficiales del suelo (3-5 cm) actuando en la zona donde se desarrollan la mayoría de las semillas de las malezas, sin afectar el cultivo. Su acción perdura de 1 a 4 meses según dosis aplicada y características del suelo (textura).

INTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación: Agitar enérgicamente el envase antes de efectuar la preparación. En la máquina cargada con la parte de agua y con los agitadores en marcha, verter la cantidad de ADAMA ESSENTIALS Linurex indicada en el cuadro de dosis y completar el volumen con agua, mantener los agitadores en marcha durante la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnica de aplicación:
Máquinas pulverizadoras de arrastre o autopropulsadas, mochilas, etc. con pastillas de abanico plano, elegidas según la velocidad de marcha teniendo en cuenta la presión y el caudal a aplicar que siempre debe ser superior a 400 l /ha. Se recomienda

el uso de filtros de malla 50 en la bomba y en los picos. Trabajar a presión necesaria para lograr 30-40 gotas/cm2. En aplicaciones aéreas el caudal de agua no será inferior a 40 l /ha.

Aplicar el producto de manera uniforme, después de una lluvia o de un riego, y una vez que el suelo esté oreado. Al momento de la aplicación las malezas no deben tener más de 4 a 6 hojas verdaderas.

RESTRICIONES DE USO
Período de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha: 60 días apio, banano, batata, caña de azúcar, cítricos, frutales de carozo y de pepita, perejil, vid y zanahoria. En el resto de los cultivos su uso es posicionado.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia"

COMPATIBILIDAD
Es compatible con herbicidas hormonales del tipo 2,4 D – 2,4 DB – MCPA. No se recomienda su mezcla con insecticidas y funguicidas.

FITOTOXICIDAD
ADAMA ESSENTIALS Linurex no resulta fitotóxico cuando es utilizado de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas en el marbete.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

CATEGORIA III. PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO.
Toxicidad inhalatoria: CATEGORIA III (CUIDADO)
MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO).

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIAL LINUREX	ADAMA ARGENTINA SA	31062	WP	50%	III
ADAMA ESSENTIALS LINURON 50 FW	ADAMA ARGENTINA SA	32221	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.