MCPA

Marcas comerciales: MCPA 28 NUFARM - MCPA AMINA 75

Nomenclatura Química:
MCPA: sal sódica del ácido 2 metil-4-clorofenoxiacético.
Clasificación Química: ácido aril oxi alcanoico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alpiste Mijo	Cardo (*Carduus acanthoides)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo negro (*Cirsium vulgare)* Cardo pendiente (*Carduus thoermeri)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Mostacilla (*Myagrum rugosum)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)*	PF 28%: 1,5 - 1,75 l/ha	20	Desde el inicio del período de macollaje, hasta antes del encañado.
Arroz		PF 28%: 2,5 - 3,5 l/ha PF 91,9%: 875 a 1225 ml/ha		Desde que macolla hasta antes del encañado.
Arveja o alverja		PF 28%: 0,5 - 0,75 l/ha PF 91,9%: 175 a 260 ml/ha		Sobre cultivo aún poco desarrollado (10 a 15 cm) y no florecido. Controlará las malezas más susceptibles y pequeñas (quinoa y mostacilla).
Avena común Cebada Centeno Trigo		PF 28%: 1,5 - 2,5 l/ha PF 91,9%: 525 a 875 ml/ha		Desde 3 a 5 hojas hasta la aparición del primer nudo de encañe.
Campos naturales		PF 28%: 2,5 - 4 l/ha PF 91,9%:875 a 1400 ml/ha		Cuando las malezas son pequeñas y crecen con vigor. Puede requerirse una segunda aplicación sobre rebrote o nuevos nacimientos.
Césped		PF 28%: 1,5 - 2,5 l/ha PF 91,9%: 525 a 875 ml/ha		Cuando las plantas del césped estén bien arraigadas.
Lino		PF 28%: 0,75 - 1,5 l/ha PF 91,9%: 525 a 700 ml/ha		Desde 8 a 20 hojas antes de que se inicie la formación del botón total.
Maíz		PF 28%: 1,5 l/ha PF 91,9%: 525 a 875 ml/ha	20	En cobertura total, maíz de 2 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada en cultivo con más de 8 hojas.
Maní		PF 28%: 1 - 1,5 l/ha PF 91,9%: 260 a 525 ml/ha		A partir de los 10 a 15 cm de altura del cultivo.
Papa		PF 28%: 1,5 l/ha PF 91,9%: 525 a 700 ml/ha		A partir de los 10 cm de altura cuando el tamaño y densidad de las malezas lo requiera.
Pasturas de gramíneas				Desde el comienzo del período de macollaje hasta antes del encañado.
Sorgo				En cobertura total, de 4 a 8 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada en cultivos con más de 8 hojas.

Información General:

Herbicida de alta selectividad, sistémico y de acción hormonal (imitador de auxinas). Se absorbe por el follaje y transloca por el floema hacia los puntos de crecimiento, donde éste actúa.
Es recomendado en aplicaciones postemergente para el control de malezas de hoja ancha en cereales y otros cultivos, indicadas en las recomendaciones de uso.
Se aplica con equipos pulverizadores convencionales terrestres con un volumen de 60 - 80 l/ha y aéreos con un volumen mayor de 12 l/ha. Es compatible su mezcla con los herbicidas a base de 2,4-D, picloram y fluroxipir.

(*) Preparación:
El agua es el vehículo ideal ya que toma una solución definitiva. Para efectuar la mezcla recomendamos proceder de la siguiente forma:
1. Agregar agua al tanque del pulverizador hasta la mitad de su volumen.
2. Mezclar aparte, en un tacho, el herbicida a utilizar con 10-15 litros de agua y luego agregarlo al tanque.
3. Completar con agua el llenado del tanque.

(*) Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Las aplicaciones pueden realizarse con equipos aéreos o terrestres. En pulverizaciones aéreas utilizar como mínimo 20-25 litros de agua por hectárea. Se debe lograr una cobertura de 20-30 gotas/cm2.
Importante: Tener especial cuidado que la pulverización no caiga ni sea llevada por el viento, sobre cultivos y plantas susceptibles tales como algodón, soja, tabaco, girasol, vid, árboles frutales, hortalizas, árboles y arbustos de adorno.

(*) RESTRICCIONES DE USO:
Periodo de carencia: Entre la aplicación y cosecha de las partes comestibles de todos los cultivos que se mencionan, deberán transcurrir por lo menos: arroz, campos naturales de pastoreo, lino, maíz, sorgo, maní, mijo, papa, praderas de gramíneas, cultivadas, cereales de invierno: 20 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

(*) TIEMPO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 48 horas.

(*) FITOTOXICIDAD:
No posee en las dosis y cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso. No aplicar en un estado fenológico diferente al recomendado en el marbete. Posibles efectos en cultivos subsiguientes: este producto se degrada completamente a las tres (3) semanas de aplicado.

(*) Producto formulado Atanor S.C.A

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): O (HRAC) o 4 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 2000-3000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 5,49 mg/l.
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado 91,9%:

Toxicidad oral aguda:	DL50: 3442,57 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 2,76 mg/l.
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Corrosivo
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico / Prácticamente no toxico (*)

(*) Producto formulado Atanor S.C.A

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MCPA 28 NUFARM	NUFARM S.A.	34567	SL	28%	III
MCPA AMINA 75	ATANOR S.C.A	31547	SL	91,9%	III