MEPIQUAT CLORURO

Marcas comerciales: ADJUST - MEPIQUAT 5 SL - PIX.

Nomenclatura Química:
Mepiquat cloruro.
Clasificación Química: amonio cuaternario.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla	1,0 - 1,5 l/ha		Aplicar cuando el cultivo tiene 4 - 5 hojas.
Algodón	0,5 - 1,5 l/ha		Según la disponibilidad de agua: Riego durante todo el período vegetativo, dosis de 1 a 1,5 l/ha aplicándolo al principio de la floración, es decir cuando hayan aproximadamente 8 a 10 primeras flores en 10 m de hileras. Altura del algodón 45 a 60 cm. Riego desde antes de la siembra hasta mediados del período vegetativo, dosis 0,5 a 1,5 /ha al principio de la floración, es decir cuando haya aproximadamente 8 a 10 flores en 10 m de hileras. Lluvias en cantidad suficiente, dosis de 1 a 1,5 l/ha al principio de la floración, es decir cuando haya aproximadamente 8 a 10 primeras flores en 10 hileras. En caso de condiciones climáticas favorables, cuando las plantas alcanzaron una altura de 0,60 m, realizar el tratamiento en ese momento. Si los efectos de Pix disminuyen y el algodón empieza a crecer de nuevo vigorosamente, efectuar una o dos aplicaciones más con una dosis de 0,5 l/ha. Zonas secas y con lluvias, dosis de 0,5 a 1,0 l/ha al principio de la floración, es decir cuando haya aproximadamente 8 a 10 primeras flores en 10 m de hilera. Realizar el tratamiento únicamente si se prevén lluvias suficientes.

Información General:

Acorta los internodios y brotes laterales, obteniéndose plantas más compactas, reduciendo el crecimiento vegetativo indeseable en algodón.
Permite una mayor retención de las cápsulas en ramas inferiores, y por ende permite obtener mayor cantidad de cápsulas maduras a la primera cosecha. Intensifica la síntesis de clorofila produciendo una coloración verde oscura en el follaje.
En ajo y cebolla, estimula el crecimiento y desarrollo de los bulbos.

Equipos de aplicación: para aplicaciones terrestres son necesarios equipos que arrojen como mínimo 200 l/ha para lograr un buen mojado del algodón.
En aplicaciones aéreas el caudal de agua no será menor que 50 l/ha.
Evitar las sobre dosificaciones.
NO aplicar más de 2 l/ha en las zonas con lluvias abundantes; 1,5 l/ha en zonas de riego y 1 l/ha en zonas secas.

Compatibilidad: es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. Los caldos resultantes deben ser aplicados inmediatamente.
Los restos de producto se neutralizan por biodegradación.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables.

Información Toxicológica:

Del formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: aprox. 464 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 4,89 mg/l 4 h
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante

Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADJUST	ROTAM	36974	SL	5%	III
MEPIQUAT 5 SL	ROTAM	37373	SL	5%	III
PIX	BASF ARGENTINA	32045	SL	5%	III