METALAXIL - M

Marcas comerciales: APRON GOLD - APRON GOLD SEMILLERO (*).

Nomenclatura Química:
metalaxil - M: Metil -N-(2,6-dimetil fenil)-N-(metoxiacetil)-D-alaninato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: acilalanina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida curasemillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Dumping-off (*Pythium spp.)* Podredumbre de la raíz (*Phytophthora spp.)*	50 cm3/100 kg de semilla.	(**)	Tratamiento de semillas. Producto especialmente indicado para el tratamiento de semillas, protegiendo la germinación e implantación de los cultivos indicados, del ataque de enfermedades como Downy Mildew y Dumping off, entre otras. La semilla tratada se puede almacenar por un período de un año, sin afectar la germinación.
Algodón	Dumping-off (*Pythium spp.)*			
Florales Ornamentales	Dumping-off (*Pythium spp.)* Podredumbre de la raíz (*Phytophthora spp.)*	25 cm3/100 kg de semilla.		
Girasol	Mildiu del girasol, Downy Mildew (*Plasmopara halstedii)*	300 cm3/100 kg de semilla.		
Maíz Sorgo	Downy mildew (*Peronosclerospora sorghi)*	150 cm3/100 kg de semilla.		
	Dumping-off (*Pythium spp.)*	50 cm3/100 kg de semilla.		
Soja	Dumping-off (*Pythium spp.)* Podredumbre de la raíz (*Phytophthora spp.)*	12 cm3/100 kg de semilla.		
Tabaco (*)	Moho azul (Peronospora tabacina)	1,5 cm3/10 m2 de almácigo		En tabaco realizar tratamientos preventivos sobre el suelo del almácigo, antes o despues de la siembra. Cuando las plantas tengan 4 a 6 hojas (4 semanas) se puede aplicar cada 15 días en mezclas con captan 80 % en aplicación drench al cuello del tallo (1,5 cm3 de APRON ® GOLD + 9 g de captan 80 %, para un almácigo de 10 m2).
	Pie negro (Phytophthora sp)	500 cm3/ha		Realizar la aplicación planta por planta en la base del tallo (drench), empleando 15 - 20 cm3 de caldo por planta, dentro de los 3 a 10 días posteriores al transplante. Mezclar con 1000 cm3/ha azoxistrobina 25 % p/v (AMISTAR ®) + 800 g/ha tiametoxam 25 % p/p (ACTARA ®)

(*) Únicamente para el producto formulado APRON GOLD
(**) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida sistémico, diseñado para ser aplicado a las semillas. Está especialmente indicado para el control de hongos que causan enfermedades como Downy Mildew (Plasmopara spp.; Peronosclerospora spp.) en los cultivos de girasol, maíz y sorgo; Dumping-off (Pythium spp.) en maíz, sorgo, soja, algodón, alfalfa, florales y ornamentales; Podredumbres de la raíz (Phytophtora spp.) en soja, alfalfa, florales y ornamentales.
El metalaxil-M, es un ingrediente activo perteneciente a la clase química de las fenilamidas. Siendo aplicado a la semilla, metalaxil-M es absorbido por la plántula y transportado por la corriente ascendente de la savia. De esta manera protege a las plantas jóvenes desde el interior, otorgando un período de protección de aproximadamente 2 a 8 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. Además, al impedir las infecciones sistémicas, reduce además el número de esporas causantes de posteriores ataques.

Nota: la formulación incolora es de uso exclusivo para criaderos y/o semilleros. Puede usarse en semillas que hayan sido previamente tratadas con curasemillas coloreados. En caso de aplicación simultánea, debe mezclarse con curasemillas coloreados. En caso de aplicación sobre semilla no tratada previamente con curasemillas coloreados, se debe agregar un colorante para tratamiento de semillas.

Preparación: debe aplicarse sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry).
Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Agitar el producto antes de usar.
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
-Agregar la cantidad requerida de producto, según la calibración realizada. No se deben exceder los 1.000 cm3 de dilución (slurry) cada 100 kg de semillas.
-Esperar hasta que el producto desaparezca en el agua, completar el volumen remanente con agua y agitar.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparado.

-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: emulsión para tratamiento de semillas.
Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma apropiada. Se debe usar el método empastado (slurry) utilizando máquinas tipo Gustafson, Miretti o similares. Cuando no se disponga de maquinaria para tratamiento de semillas, o la cantidad a tratar es limitada, se puede utilizar un tambor giratorio o hormigonera.
NO exceder la cantidad de 1.000 cm3 por cada 100 kg de semillas, ya que la humedad influye desfavorablemente en la germinación, especialmente al incrementarse el tiempo de almacenamiento de la semilla.
NO aplicar el producto directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Restricciones de uso:
La semilla tratada con este producto no debe destinarse al consumo humano ni a la alimentación animal. Está indicado para el tratamiento de semillas destinadas exclusivamente para la siembra.
Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para tratamiento de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes al metalaxil-M, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo 4 de los FUNGICIDAS.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con captan y tiram. Antes de utilizar en mezcla con otros productos, se debe realizar una prueba a pequeña escala, para corroborar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: cuando es usado según las recomendaciones, este producto no altera el poder ni la energía germinativa de las semillas de los cultivos citados en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: = 1150 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 4.000 mg/kg (rata)
CL 50 Inhalación >3,721 mg/L

No irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para aves.
Ligeramente tóxico para abejas.
Aunque debido a su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Se recomienda no tratar más semilla de la que se va a usar en la campaña. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.
Prácticamente no tóxico para organismos acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
APRON GOLD	SYNGENTA AGRO	33437	ES	35%	II
APRON GOLD SEMILLERO (*)	SYNGENTA AGRO	34187	ES	35%	II

(*) Formulación incolora de uso exclusivo para criaderos y/o semilleros.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.