METAMIDOFOS

Nomenclatura Química:
metamidofos: amida del éster-O-S-dimetil-tiofosfórico o O,S- dimetil fosforoamidotioato
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	600 - 800 cm3/ha	30	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga.
	Pulgón de la alfalfa (*Acyrthosiphon pisum)*	500 - 600 cm3/ha		
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	1,0 l/ha	21	
	Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)* Trips (*Thrips spp.)*	350 cm3/ha		
Chaucha	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Gorgojo del tomate (*Phyrdenus muriceus)* Mosca blanca (*Trialeurodes spp.)* Polilla del tomate (*Scrobipalpuloides absolutus)* Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)* Vaquita de los melones (*Epilachna paenulata)*	100 - 150 cm3/hl		Aplicar al aparecer la plaga. Repetir en caso de ser necesario.
Cucurbitáceas Pimiento Poroto Tomate			10	
Frutales de carozo	Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	30 cm3/hl	21	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	650 - 1200 cm3/ha		Aplicar al observar en promedio 5 orugas por planta.
Papa	Cotorrita (*Empoasca fabae)* Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)* Pulguilla (*Epitrix argentinensis)*	800 cm3/ha	14	Aplicar al observar los primeros ataques de la plaga.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	1,0 - 1,2 l/ha	30	Soja de primera con 30% de brotes atacados. Soja de segunda con 10 - 15% de brotes atacados.
	Chinche verde (*Nezara viridula)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	800 cm3/ha		Cuando haya 2 chinches más por metro lineal de surco o 10 - 15 orugas por metro lineal de surco.
Tabaco	Pulgón rojo (*Myzus nicotianae)*	500 - 700 cm3/ha		Aplicar cuando aparecen las primeras colonias en el cultivo.

Información General:

Este producto tiene una persistencia de acción de 2 a 3 semanas.

Equipos de aplicación: está prohibido utilizar este producto con pulverizadoras tipo mochila.
Puede ser aplicado con equipos terrestres convencionales o en aplicaciones aéreas.

Caudal: variable según cultivo. Asegurar siempre un buen cubrimiento del follaje.
Tipo de pastilla: preferentemente del tipo cónico.
Presión: 50-80 lb/pulg2.
Número y tamaño de gotas: 50-70/cm2 de 50-200 micrones.

Condiciones y advertencias especiales: NO aplicar con vientos > 10 km/h.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas usuales.
NO mezclar con productos de reacción alcalina. En frutales de carozo no debe ser aplicado hasta el fin de floración.

Mecanismo de acción: inhibidor de la colinesterasa.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.
Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Durante su aplicación usar ropa protectora adecuada, mascarilla con filtro para absorción de gases de fósforo, antiparras, botas y guantes de nitrilo. No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación de la dilución. No comer, beber o fumar durante las tareas. No destapar con la boca los picos pulverizadores. No transportar ni almacenar con alimentos. No conviene recorrer sin protección adecuada las plantaciones o cultivos tratados con este insecticida hasta haber transcurrido como mínimo cinco días desde la fecha de tratamiento, debiendo colocarse carteles visibles advirtiendo que se haya empleado un fosforado. No debe venderse a personas inexpertas ni para ser utilizado en ambientes domésticos.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda para ratas: 20 mg/kg
DL 50 dermal aguda para ratas: 130 mg/kg

Primeros auxilios
Antídoto: atropina y 2 PAM. Se puede usar también 2 PAM junto con atropina.
Para mayor información ver el capítulo "EMERGENCIAS MÉDICAS POR PRODUCTOS FITOSANITARIOS", específicamente el tema insecticidas órgano-fosforados.

Riesgos ambientales

Altamente tóxico para abejas. Muy tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.