METCONAZOLE

Marcas comerciales: CARAMBA.

Nomenclatura Química:
metconazole: (1RS, 5RS: 1RS, 5SR)-5- (4-clorobencil)-2,2 dimetil-1- (1H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanol
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Roya del ajo (*Puccinia allii)*	700 cm3/ha	30	En general, la mayor susceptibilidad del cultivo a la roya en ajo "puccinia allí" se correlaciona con las condiciones de humedad excesivas: rocío o lluvias. Normalmente esto ocurre sobre ajos en estado de madurez (10-11 hojas verdaderas), en los meses de octubre y noviembre, en las zonas productivas del país. Ej. Cuyo. Se recomienda monitorear en forma sistemática los lotes y aplicar con la aparición de primeros síntomas. Si las condiciones climáticas persisten, será necesaria una segunda aplicación a los 10-15 días de la primera. Debido a la susceptibilidad diferencial de las distintas variedades, se recomienda observar con mayor atención el cultivar Morado o "ajo chino".
Soja	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	500 - 600 cm3/ha	15	En caso que en la región ya se hayan detectado síntomas de Roya asiática es necesario monitorear el cultivo semanalmente desde estadios vegetativos y aplicar a los primeros síntomas de esta enfermedad. En el caso de que no se detecten síntomas hasta inicio de formación de vainas (R3), aplicar en ese momento en forma preventiva, de ser necesario reaplicar por re-infecciones de roya asiática, hacerlo hasta R5 (75% de llenado de granos).
Trigo	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Oídio del trigo (*Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)*	900 cm3/ha	50	Por sus características preventivas y curativas, en tratamientos de enfermedades foliares, puede utilizarse a partir de la aparición de los primeros síntomas de cada enfermedad y cuando las perspectivas de evolución de enfermedad sean favorables. Días húmedos, viento, lluvias y temperaturas de 10 a 30ºC favorecen a Drechslera tritici repentis (mancha amarilla). El rocío favorece a oídios (Erysiphe graminis) y roya anaranjada (Puccinia recondita var. tritici), adicionalmente, a ésta la predispone mejor el sol y el viento con temperaturas de 20ºC, y a los oídios las temperaturas de 10 a 15ºC y cultivos densos. La roya estriada o amarilla (Puccinia striiformis) aparece con temperaturas más bien bajas, de 10 a 15º C, lluvia y viento. La septoriosis (Septoria tritici) evoluciona cuando hay alta humedad, neblinas o lloviznas dentro de los 15 a 20º C. Conociendo los patógenos, es necesario monitorear a partir del macollaje periódicamente al cultivo para detectar síntomas de las enfermedades antes mencionadas. Según el cultivo, la expectativa de rinde y la calidad esperada, podrán comenzarse los tratamientos desde la aparición de la sintomatología hasta un poco más adelante, mientras no se ponga en riesgo al cultivo. Mientras no se establezcan umbrales de sintomatología a partir de los cuales tomar la decisión de aplicación, un criterio práctico general es el de evitar que cualquier enfermedad foliar llegue a la hoja bandera, que tiene un importante papel en el llenado del grano. En el caso específico de fusariosis de la espiga o golpe blanco, el tratamiento es netamente preventivo y debe realizarse a partir de comienzo de antesis, es decir desde que las primeras anteras están expuestas. El asperjado del producto debe tener como blanco al centro de la espiga, el blanco es el filamento de la antera (lugar sobre el que germinan las ascosporas de Fusarium graminearum para iniciar la infección del cultivo). Cuando se realiza un tratamiento preventivo de fusariosis de la espiga, se está también actuando sobre otros hongos que causan enfermedades foliares, por lo que este tratamiento puede ser complementario de alguno hecho con anterioridad para tal fin. Para lograr un buen asperjado y cobertura (gotas/cm2), teniendo en cuenta que el blanco de aspersión son los filamentos de las anteras, se sugiere lograr una densidad de 60 - 80 gotas/cm2 manteniendo el C.V. en 50%. Bajo ciertas condiciones ecológicas y algunas variedades del mercado los trigos tratados con metconazole pueden presentar un ligero punteado blanquecino en las hojas. Esta sintomatología puede perdurar en el tiempo, pero no afecta al rendimiento ni a la calidad comercial del grano.

Información General:

Es un fungicida de amplio espectro, con propiedades protectoras y curativas, para ser utilizado en el cultivo de trigo soja y ajo. El metconazole es un fungicida de la familia de los triazoles que inhibe la biosíntesis de ergosterol en los hongos. De esta manera se inhibe la síntesis de membranas celulares necesarias para el crecimiento y multiplicación es estas especies. El producto es rápidamente absorbido por la planta, presentando una penetración local y sistemicidad acrópeta cuando es aplicado al follaje. Siendo un producto curativo, las pústulas o manchas presentes no progresan y se evita la reinfestación mientras dure la residualidad del producto.

Derrames:

En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.), luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.

Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50 macho: 3536 mg/kg DL50 hembra: 2102 mg/kg
Toxicidad dermal (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 9,57 mg/l
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	No irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. En contacto con los ojos causa irritaciones. No es irritante para la piel. No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos:	Moderadamente tóxico

Dañino para ácaros predadores. No tóxico para lombrices de tierra ni microorganismos del suelo. Mínimo riesgo para el medio biótico y cierta persistencia para el medio abiótico. Producto no dañino para los organismos benéficos frecuentes de la región cerealera del país.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CARAMBA	BASF ARGENTINA	33483	SL	9%	III