METOXIFENOCIDE

Marcas comerciales: INTREPID SC - RUNNER FUSION.

Nomenclatura Química:
metoxifenocide: N´- tert - butil - N´(3,5-dimetilbenzoil)-3-metoxi-2-metilbenzohidracida.
Clasificación Química: diacilhidrazina.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca bolillera (*Helicoverpa gelotopoeon)*	150 cm3/ha	1	Realizar la aplicación cuando se observe presencia de la plaga en el cultivo en niveles de 6 - 10 individuos por golpe de red. Agregar tensioactivo 0,2 % v/v y/o aceite vegetal (1,5 l/ha) según las condiciones ambientales.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	120 cm3/ha		
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	150 cm3/ha		
Algodón	Gusano cogollero (*Heliothis virescens)* Oruga capullera (*Spodoptera frugiperda)* Oruga del capullo del algodonero, Oruga de la cápsula del algodonero (*Helicoverpa gelotopoeon)*	300 cm3/ha	(*)	Realizar las dos (2) primeras aplicaciones con metoxifenocide para el control del complejo "cogollero" aprovechando el respeto por benéficos y predadores del producto. Aplicar hasta pre floración. Agregar coadyuvante 0,2 % v/v 150 cm3/ha. Presenta un satisfactorio control de Alabama argillacea (oruga de la hoja) cuando se aplica en estadios tempranos (L1 y L2).
Duraznero	Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta)*	30 cm3/hl de agua.	5	Comenzar las aplicaciones con la caída de mariposas en las trampas, lo más temprano posible. Si existe Servicio de Alarma, aplicar según sus recomendaciones. Considerar una residualidad de 10 a 12 días según las recomendaciones del Servicio de Alarma.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	200 cm3/ha	21	Agregar aceite vegetal a la dosis de 1,5 l/ha y asegurar un caldo mínimo de 10 l/ha en aplicaciones aéreas. Comenzar los tratamientos con 8-10 orugas por planta en estadios tempranos (L1 a L3).
Manzano Peral	Gusano de la pera y la manzana (*Cydia pomonella)* Gusano del brote del duraznero (*Cydia molesta)*	30 cm3/100 litros de agua.	14	Valle de Río Negro: realizar la primera aplicación a los 180 carpogrados. Considerando una residualidad de 14 días, según Servicio de Alarma. Mendoza: cuando se capturen 10 a 12 machos en trampas durante 3 días consecutivos, aplicar 48 horas después. Los siguientes tratamientos se realizarán según la captura de machos, considerando una residualidad de 14 días. Se recomienda comenzar con metoxifenocide y luego rotar con otros productos en aplicaciones alternadas. Realizar 4 aplicaciones como máximo, siendo dos de estas al final, aprovechando su menor tiempo de carencia.
Nogal	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	30 cm3/100 litros de agua	1	Para el caso de carpocapsa realizar la primera aplicación de metoxifenocide a los 180 carpogrados aprovechando su actividad ovicida. Considerar una residualidad de 14 días según Servicio de Alarma.
Soja	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	100 cm3/ha		Comenzar los tratamientos cuando la defoliación es superior al 20% antes de la floración, y 10% en floración o en formación de granos, y se encuentren más de 15 isocas por metro de surco. Aplicar cuando las orugas se encuentren entre los estadios L1 y L3. Agregar 150 cm3/ha de coadyuvante.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	120 cm3/ha		
Tomate	Polilla del tomate (*Tuta absoluta)*	35 - 50 cm3/100 litros de agua.		Comenzar los tratamientos cuando se detecten los primeros vuelos de la plaga, considerando una residualidad de 8 a 10 días. Se recomienda la rotación con otros productos y mezclar con piretroides cuando se observen vuelos adultos. Agregar 30 cm3 de coadyuvante/100 litros de agua
Vid	Polilla de la uva (*Lobesia botrana)*	30 cm3/100 litros de agua	7	Se recomienda la aplicación de metoxifenocide especialmente en la primera generación de la plaga, a fin de aprovechar la alta efectividad de este producto como ovicida tanto de contacto como residual, además de su acción larvicida por ingestión metoxifenocide tiene una residualidad de 20 días en órganos desarrollados por lo que puede realizarse una segunda aplicación al cumplirse este plazo, o acortar el plazo entre aplicaciones en periodos de activo crecimiento. No

				recomendamos aplicaciones en generaciones sucesivas o más de dos aplicaciones por generación.

Nota: las dosis corresponden a plagas en el umbral de daño económico y es necesario consultar siempre al asesor ingeniero agrónomo.

(*) TC en algodón:
Semilla: 1
Aceite: sin carencia

Información General:

Es un insecticida que presenta un nuevo modo de acción, que afecta a las larvas de lepidópteros, acelerando su proceso de muda y también presenta acción ovicida. Las larvas dejan de alimentarse y mueren a los pocos días. Actúa por ingestión, y en menor medida por contacto. No actúa sobre insectos de otros grupos como depredadores o benéficos, lo que permite su uso en programas de control integrado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicar 50 - 70 gotas/cm2.
1) Algodón:
Equipos terrestres:
Pastillas: cono hueco. Volumen: 200 l/ha. Presión: 80-100 lb/pulg2.
Equipos aéreos:
Volumen: 10-15 l/ha de caldo total, incluyendo en éste 1,5 litros de aceite vegetal. Presión: 15-30 lb/pulg2. Altura de vuelo: 4-5 m.
Mochila:
Volumen: 200 l/ha. Presión: 40-60 lb/pulg2. Pastillas tipo insecticida (D2 a D4).
2) Soja y girasol:
Equipos terrestres:
Pastillas: cono hueco. Volumen: 100-120 l/ha. Presión: 80-100 lb/pulg2.
Equipos aéreos:
Volumen: 10-15 litros/ha de caldo total, incluyéndose en éste 1.5 litros de aceite vegetal. Presión: 15-30 lb/pg2. Altura de vuelo: 4-5 m.
3) Manzano, peral, duraznero y nogal:
Equipos atomizadores de alto volumen:
Volumen: 2000 l/ha. Presión: 300 - 350 lb/pulg2. Aplicar hasta punto de goteo.
4) Tomate:
Mochila:
Volumen: 500 - 1000 l/ha. Presión 40 - 60 lb/pulg2. Pastillas tipo insecticida (D4 a D6). Se recomienda mojar bien todas las partes del cultivo. En condiciones que permitan un rápido desarrollo vegetativo del cultivo, se deben acortar los intervalos de aplicación para que la nueva brotación esté protegida.
5) Vid:
Volumen: 500 - 1000 litros en función del tamaño de las plantas y la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación. Utilizar boquillas con pastillas cónicas.
Número de gotas: aplicar 50-70 gotas/cm2

Aplicación: llenar el tanque del equipo hasta la mitad, agregar la dosis recomendada, con el sistema de agitación en funcionamiento, y completar el resto del tanque.
Mojar bien todas las partes del cultivo. En condiciones que permitan un rápido desarrollo vegetativo del cultivo se deben acortar los intervalos de aplicación para que la nueva brotación esté protegida.

Compatibilidad: no hay evidencias de incompatibilidad con otros fitosanitarios o fertilizantes normalmente utilizados en los cultivos registrados. Debe evitarse la mezcla con sustancias fuertemente ácidas.

Fitotoxicidad: no se ha observado, en los cultivos recomendados.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 18 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 3,7 mg/l

Irritación dermal en conejo: leve irritante
Irritación ocular en conejo: leve irritante
Sensibilización dermal en chanchitos de guinea: no sensibilizante.

Primeros auxilios: en caso de contacto con la piel: quitar la ropa y lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de ingestión no provocar el vómito. Diluir dando de beber dos vasos de agua. En todos los casos de persistir los síntomas, llame al médico.
Inhalación: retire a la persona afectada a un lugar aireado.
Advertencia para el médico: realizar tratamiento sintomático. Antídoto: no posee.

Riesgos ambientales
Prácticamente no tóxico para peces. No aplicar sobre cursos o fuentes de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
INTREPID SC	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33473	SC	24%	IV
RUNNER FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33518	SC	24%	IV