MICLOBUTANIL

Marcas comerciales: RALLY - SYSTHANE E - SYSTHANE W.

Nomenclatura Química:
miclobutanil: butil (4-clorofenil) 1H-1,2,4-triazol-1-propanitrilo ó 2-p-clorofenil-2-(1H-triazol-1-ilmetil) hexanitrilo.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Césped (Pasto Bermuda) Festuca Pasto de invierno Raigrás	Mancha de la hoja (*Drechslera sorokiniana)* Mancha de la hoja en primavera (*Drechslera poae)* Mancha en rueda del Césped (*Sclerotinia homeocarpa)* Mancha marrón del césped (*Rhizoctonia solani)*	PC 10%: 5,6 - 7,6 kg/ha PC 12,5%: 4,6 - 6,3 l/ha PC 25%: 2,3 - 3,15 l/ha PC 40%: 1,4 - 1,9 kg/ha	SR	Comenzar el tratamiento a fines de otoño y repetir 1 o 2 veces en primavera con un intervalo de 14 días.
Clavel	Roya (*Uromyces caryophyllinus)*	PC 10%: 80 - 100 g/hl PC 40%: 20 - 25 g/hl		Tratar preventivamente cada 7 días.
Crisantemo	Roya del crisantemo (*Puccinia tanaceti)*	PC 10%: 80 g/hl PC 40%: 20 g/hl		Comenzar con la brotación. Repetir cada 20 días en caso de necesidad.
Cucurbitáceas (Zapallo, melón, sandía, pepino)	Oídio (*Oidium ambrosiae)*	PC 10%: 32 g/hl o 140 - 200 g/ha (*) PC 12,5%: 28 cm3/hl o 280 cm3/ha (*) PC 25%: 14 cm3/hl o 140 cm3/ha (*) PC 40%: 8 g/hl o 35 - 50 g/ha (*)	5	Aplicar cuando se entrecruzan las guías y proseguir en caso de necesidad.
Duraznero Nectarina	Oídio (*Sphaerotheca pannosa var. persicae)* Podredumbre morena de los frutales (**) (*Monilinia fructicola)*	PC 10%: 40 g/hl o 600 g/ha (*) PC 12,5%: 34 cm3/hl o 500 cm3/ha (*) PC 25%: 17 cm3/hl o 250 cm3/ha (*) PC 40%: 10 g/hl o 150 g/ha (*)	30	Aplicar en botón rosado y pétalos caídos, y continuar cada 15 - 20 días en caso de necesidad.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	PC 10%: 60 g/hl o 1000 g/ha (*) PC 12,5%: 50 cm3/hl o 900 cm3/ha (*) PC 25%: 25 cm3/hl o 450 cm3/ha (*) PC 40%: 15 g/hl o 250 g/ha (*)	21	Aplicar en botón rosado y pétalos caídos, y 15 - 20 días después.
Manzano Peral	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)* Sarna del peral (*Venturia pirina)*	PC 10%: 40 g/hl o 720 g/ha (*) PC 12,5%: 34 cm3/hl o 600 cm3/ha (*) PC 25%: 17 cm3/hl o 300 cm3/ha (*) PC 40%: 10 g/hl o 180 g/ha (*)		Comenzar en puntas verdes y si la presión de sarna es alta, repetir cada 7 días (manzano: botón rosado, 20% de floración, plena floración y 2/3 partes de pétalos caídos; peral: ramillete expuesto, 20% de floración, 2/3 floración, 2/3 partes de pétalos caídos). Si la presión de la enfermedad es moderada a débil (clima seco) repetir cada 10 días (puntas verde, botón rosado y 2/3 partes de pétalos caídos). En post-floración aplicar mancozeb (200 g/hl), y repetir cada 10 - 12 días. Si hay fuerte presión de la enfermedad aplicar miclobutanil 40% o 10% intercalado con mancozeb. Miclobutanil puede usarse hasta 72 horas después de producida la infección de sarna. Si en la zona existe Servicio de Alarma para sarna, se recomienda seguir sus indicaciones.
Parrales Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	PC 10% (Uva de mesa y pasas): 48 g/hl o 480 g/ha (*) PC 10% (Uva para vinificar): 40 g/hl o 400 g/ha (*) PC 12,5%: 34 cm3/hl o 340 cm3/ha (*) PC 25%: 14 cm3/hl o 140 cm3/ha (*) PC 25%: 17 cm3/hl o 170 cm3/ha (*)		Tratamientos tempranos (preventivos): Primera pulverización: con 5 - 10 cm de brote en uvas para vinificación.

		PC 40% (Uva de mesa y pasas): 10 g/hl o 100 g/ha (*) PC 40% (Uva de mesa y pasas): 12 g/hl o 120 g/ha (*) PC 40% (Uva para vinificar): 10 g/hl o 100 g/ha (*) PC 40% (Uva para vinificar): 8 g/hl u 80 g/ha (*)		
		PC 10% (Uva para vinificar): 32 g/hl u 320 g/ha (*) PC 10% (Uva de mesa y pasas): 40 g/hl o 400 g/ha (*) PC 12,5%: 28 cm3/hl o 280 cm3/ha (*) PC 25%: 14 cm3/hl o 140 cm3/ha (*) PC 40% (Uva para vinificar): 8 g/hl u 80 g/ha (*) PC 40% (Uva de mesa y pasas): 10 g/hl o 100 g/ha (*)		Segunda pulverización: en pre-floración. Tercera pulverización: con frutos cuajados del tamaño de un grano de pimienta. Las dosis del segundo y tercer tratamiento son de mantenimiento. Intervalo entre pulverizaciones: 15 - 20 días. Después de la tercera pulverización: se puede proseguir el programa de control aplicando azufre hasta poco antes de la cosecha.
		PC 10%: 60 - 80 g/hl o 600 g/ha (*) PC 12,5%: 40 - 80 cm3/hl o 600 cm3/ha (*) PC 25%: 20 - 40 cm3/hl o 300 cm3/ha (*) PC 40%: 15 - 20 g/hl o 150 g/ha (*)		Tratamientos tardíos (curativos): cuando hayan aparecido los primeros síntomas de oídio, para contener su ataque.
Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	PC 10%: 60 g/hl o 1000 g/ha (*) PC 40%: 15 g/hl o 250 g/ha (*)		Aplicar en botón rosado y pétalos caídos, y 15 - 20 días después.
Rosales	Mancha negra del rosal (*Diplocarpon rosae)* Oídio del rosal (*Oidium leucoconium var. rosae)* Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)*	PC 10%: 80 g/hl PC 40%: 20 g/hl	SR	Comenzar las aplicaciones en primavera con la brotación, repetir cada 7 a 10 días.
Soja	Enfermedades de fin de ciclo: (***) (*Grupo)*	PC 12,5%: 800 - 1000 cm3/ha PC 25%: 400 - 500 cm3/ha		Tratamientos preventivos: A partir de R3-R4, frente a condiciones predisponentes para el desarrollo de enfermedades, aplicar en mezclas con carbendazim (500 cm3/ha).
	Roya de la Soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Tratamientos preventivos: hacer una aplicación entre Vn y R4 si hay presencia de inoculo en la zona y condiciones predisponentes continuas para el desarrollo de la enfermedad más de 7 horas de mojado de la hoja). Tratamientos curativos: aplicar entre Vn y R4 con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en las hojas inferiores del cultivo. Se recomienda realizar monitoreos continuos.

(*) Mínimo a aplicar.
(**) Solo Systhane W y Dakar W.
(***) Enfermedades de fin de ciclo: Cercospora kikuchii, Cercospora sojina, Septoria glycines, Complejo Diaporthe-Phomopsis, Peronospora manchurica, Colletotrichum truncatum, Alternaria spp.

Información General:

Es un fungicida sistémico que está especialmente indicado para el control de oídio, en viñas, frutales de pepita y carozo, melón y zapallo, la sarna del manzano y el peral y las enfermedades fungosas que afectan diversas especies de céspedes. Tiene acción preventiva y curativa sobre las enfermedades fungosas y las controla cuando se encuentran en las primeras etapas de su desarrollo. Tiene prolongada actividad residual y en el caso especifico de la uva para vinificar no afecta el proceso de fermentación.

Mecanismo de acción: inhibe la demetilación de los esteroides.

Derrames:

Formulación 40 % y 10 % WP:

Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su incineración en sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Formulación 25 % y 12,5 % EC:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 40%:
DL 50 oral aguda en rata: 1870 - 2090 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejos: > 5000 mg/kg.
CL50 Toxicidad Inhalatoria rata 4hs > 5.0 mg/l

Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado al 25%:
DL 50 oral aguda en rata: 1280 - 1800 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejos: 5000 mg/kg.
CL50 Toxicidad Inhalatoria rata 4hs > 5.0 mg/l

Irritación dermal:	Severo irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado al 10%:
DL 50 oral aguda en rata: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejos: > 2000 mg/kg.

Del producto formulado al 12,5%:
DL 50 oral aguda en rata: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejos: > 2000 mg/kg.

Riesgos ambientales:

Del producto formulado al 10%:
Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar cursos y cuerpos de agua. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas.

Del producto formulado 12,5%:
Producto prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua. Dejar una zona buffer de 3 metros entre la aplicación y fuentes o cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización. Ligeramente tóxico para abejas. No aplicar en las cercanías de colmenas, en cultivos en floración y en el horario de pecoreo de las abejas. Si no pueden retirarse las colmenas, se deben tapar la entrada de las piqueras con una arpillera húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano. Avisar a los vecinos que se aplicara un producto riesgoso para las abejas.

Del producto formulado al 25%:
Prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos, virtualmente no tóxico para abejas. Evitar contaminar cursos y cuerpos de de agua. El producto no presenta riesgos para el ambiente si se aplica de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

Del producto formulado al 40%:
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar cursos y cuerpos de agua. Ligeramente tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RALLY	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	33833	EC	25%	II

SYSTHANE E	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30070	EC	25%	II
SYSTHANE W	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30071	WP	40%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.