MSMA

Marcas comerciales: ESSENTIALS ARSONEX.

Nomenclatura Química:
MSMA: sal monosódica del ácido metilarsónico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: organoarsenical.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Altamisa (*Ambrosia tenuifolia)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Roseta (*Cenchrus pauciflorus)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	3,0 l/ha		Los tratamientos deben realizarse desde que las plantas tienen 8 cm de alto hasta antes de la primera floración, cuando las malezas alcanzan la altura de 5 cm, con picos orientados para evitar mojar el cultivo, aplicar en 400-500 litros de agua por hectárea. Puede hacerse una segunda aplicación con intervalo de 2 a 3 semanas. Si se moja el follaje del cultivo pueden aparecer temporariamente algunas manchas y coloración rojiza, que no afectarán su desarrollo ni el rendimiento del cultivo.
Caña de azúcar		3,0 l/ha 0,73 l/ha (*)		Realizar la aplicación en forma dirigida procurando mojar bien la maleza y no las plantas de caña. A los efectos de evitar la acumulación de residuos se deberá suspender su uso 180 días antes de la cosecha de la caña de azúcar (*) Para tratamiento de manchones, mojar bien la maleza hasta goteo.
Viñas Parrales		3,0 l/ha		Aplicar en los callejones, mojando la maleza hasta goteo. En caso de rebrotes, efectuar una segunda aplicación
Árboles frutales		0,73 a 1,2 l/ha		Aplicar en la taza (zona cubierta por la proyección de la copa) o en los callejones, mojando la maleza hasta goteo, en caso de rebrotes efectuar una segunda aplicación. No mojar follaje, tallos o frutos
Áreas no cultivadas		3,0 l/ha		Mojar completamente el follaje de las malezas. Si es necesario aumentar el caudal hasta 1500 l de agua por ha. Repetir en caso de rebrotes.
Cereales Girasol Maíz Praderas Soja Sorgo	Cebollín *(Cyperus rotundus)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	3,0 a 3,65 l/ha 0.73 l/ha(*)		En lotes a sembrar con maíz, sorgo, girasol, soja, cereales y praderas, se recomienda proceder a la destrucción de tallos y rizomas con disco de doble acción. Esperar el rebrote y cuando la planta tiene un buen desarrollo vegetativo y antes de la floración (30-40 cm de altura) hacer la aplicación utilizando un mínimo de 400 litros /ha. (*) Si el tratamiento se hace sobre manchones, aplicar mojando hasta punto de goteo.

Información General:

Herbicida con acción de contacto y sistémico, traslocable, para aplicaciones de post-emergencia exclusivamente. Su acción se manifiesta a los pocos días del tratamiento, afectando a la parte aérea. Su propiedad de traslocarse hace que actúe sobre los rizomas y raíces provocando la muerte de la planta. Carece de acción de pre-emergencia. No deja residuos en el suelo por su fácil degradación en el mismo.
Las condiciones óptimas de aplicación son: temperaturas superiores a 24ºC, buena insolación y ambiente seco.
No debe aplicarse con temperaturas inferiores a 18ºC.
Este herbicida es absorbido por el follaje en un lapso de 5-6 horas, la lluvia ocurrida posteriormente no interfiere en el resultado.
Preparación:
Cargar con agua el tanque del equipo hasta la mitad. Poner los agitadores en funcionamiento y adicionar la dosis del herbicida. Completar hasta el volumen necesario. Utilizar el producto el mismo día de su preparación
Cuando se aplique en mezcla, en todos los casos diluir primero ESSENTIALS ARSONEX en el agua y luego agregar a la dilución el otro pesticida. Es recomendable realizar una prueba previa con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de la mezcla.

Equipos, Volúmenes y Técnica de Aplicación
Equipos terrestres:
Utilizar un caudal de 400-600 litros /ha, con una presión de trabajo de 1.7 a 3 kg/cm^3 (25 a 45 lb/pulg^2) Utilizar un humectante de uso agrícola (0.5-1 % según indicación del producto) Aplicar con pastillas de abanico plano.
Suspender la aplicación con vientos superiores a 10 km/h. Utilizar agua limpia y evitar el uso de agua alcalina y/o salitrosa que puede degradar el producto y disminuir su efectividad.
N° de gotas: 30-40 /cm2

Restricciones de uso**:** Exento para los cultivos mencionados.
Tiempo de reingreso al área tratada: Dejar transcurrir 24 horas desde la aplicación.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia

Compatibilidad: este herbicida es compatible con un gran número de pesticidas. Evitar la mezcla con agroquímicos de reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No utilizar en épocas de sequía. En caso de que las malezas emerjan antes de la activación del herbicida, realizar una pasada rápida y liviana con rastra rotativa, de manera de mezclar el herbicida con los 2 ó 3 cm superiores de suelo.
Es aconsejable perturbar lo menos posible el terreno tratado para evitar que el herbicida disminuya su eficacia por la tierra no tratada.

Advertencia**:** Si el producto ha estado almacenado a temperaturas muy bajas, puede presentar un sedimento por cristalización que se disuelve calentando el envase en un baño de agua muy caliente

Clasificación (modo o sitio de acción): Ø (HRAC).

Información Toxicológica:

Clase toxicológica II
Producto moderadamente peligroso
Aplicar tratamiento para arsenicales

Irritación ocular: Moderado
Irritación dermal: Leve
Evitar el contacto con la piel y la ropa
Toxicidad Inhalatoria Categoría II (nocivo), usar máscara protectora

En caso de ingestión, el lavado estomacal puede ser indicado. La literatura recomienda para los casos de intoxicación arsenical tratar con BAL o d-penicillamine.
Las personas que son sensibles a la penicilina pueden sufrir una reacción alérgica.
BAL es recomendado especialmente para casos de personas alérgicas a la penicilina, inyectándole una ampolla intramuscular.
Controlar las funciones vitales, seguir con tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ESSENTIALS ARSONEX	ADAMA ARGENTINA SA	36178	SL	79%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.