OXICLORURO DE COBRE

Marcas comerciales: CAURIFIX S - CAURIFIX WG - RECOP.

Nomenclatura Química:
Oxicloruro de cobre.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto y preventiva.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	PC 50%: 720 cm3/hl PC 84%: 400 g/hl	14	1) Al aparecer los cotiledones. 2) Al trasplante. Repetir cada 10 días.
Almendro	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*	PC 50%: 300 cm3/hl PC 84%: 200 - 400 g/hl		Cuando comienzan a hincharse las yemas.
		PC 50%: 400 cm3/hl PC 84%: 400 - 600 g/hl		En otoño, poco antes de la caída de las hojas.
Apio	Viruela del apio (*Cercospora apii)*	PC 50%: 450 - 550 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl		1) En el almácigo. 2) Siguientes: después del trasplante. Suspender antes de la floración.
Arveja o alverja	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi)*		7	Para PC 84%: cuando comienzan a brotar las plantas.
		PC 50%: 550 - 720 cm3/hl PC 84%: 400 g/hl		Para PC 84%: en plantas de 20 - 30 cm de altura. Siguientes: repetir cada 20 días.
Cerezo Ciruelo	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*	PC 50%: 300 cm3/hl PC 84%: 250 - 500 g/hl	14	Después de la brotación, cuando comienzan a desarrollarse los pétalos y repetir después de la caída del cáliz. Dosis: 400 - 600 g/hl : 1) En otoño poco antes de la caída de las hojas. Dosis: 300 - 400 g/hl : 2) Al hincharse las yemas. 3) Después de la floración.
	Torque (*Taphrina deformans)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 500 g/hl		1) En otoño antes de la caída de las hojas. 2) Al hincharse las yemas. No aplicar en plena floración.
Cítricos o citrus	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl		1) Antes de la floración. 2) Después de la floración. 3) A los 20 - 30 días del segundo tratamiento.
	Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl		1) Antes de la floración. 2) A la caída de los pétalos. 3) Cuando el fruto tiene 1 - 2 cm. de diámetro. 4) Después de 40 - 50 días. 5) Después de 40 - 50 días.
	Fumagina de los citrus (*Capnodium citri)*	PC 50%: 250 cm3/hl PC 84%: 250 g/hl		1) A los 30 días de fecundada la flor. 2) 20 días después. Combatir los pulgones y cochinillas que favorecen el desarrollo de fumaginas.
	Mancha grasienta de los citrus (*Mycosphaerella citri)*	PC 50%: 350 - 385 cm3/hl PC 84%: 200 - 250 g/hl		En diciembre - enero y repetir en febrero - marzo.
	Melanosis (*Diaporthe citri)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl		1) Recién formado el fruto. 2) A los 20 - 30 días.
	Sarna del naranjo agrio (*Sphaceloma fawcettii var. scabiosa)*			1) Antes de la floración, cuando aparecen los primeros botones florales. 2) Después de la floración. 3) Cuando cayeron las 3/4 partes de los pétalos.
Clavel	Viruela del clavel (*Septoria dianthi)*	PC 50%: 550 - 720 cm3/hl PC 84%: 0,4 - 0,6 kg/l		Tratamientos preventivos cada 15 - 20 días, desde que los gajos han arraigado hasta antes de la floración.
Damasco	Mal de la munición (*Coryneum carpophilum)*	PC 50%: 300 - 400 cm3/hl PC 50%: 300 cm3/hl PC 84%: 250 - 500 g/hl		Después de la brotación, cuando comienzan a desarrollarse los pétalos y repetir después de la caída del cáliz. Dosis: 400 - 600 g/hl : 1) En otoño poco antes de la caída de las hojas. Dosis: 300 - 400 g/hl : 2) Al hincharse las yemas. 3) Después de la floración.

	Torque (*Taphrina deformans)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 500 g/hl		1) En otoño antes de la caída de las hojas. 2) Al hincharse las yemas. No aplicar en plena floración.
Duraznero	Mal de la munición (*Coryneum carpophilum)*	PC 84%: 250 - 500 g/hl PC 50%: 300 cm3/hl		Al hincharse las yemas.
		PC 50%: 400 - 300 cm3/hl		En otoño, poco antes de la caída de las hojas.
		PC 84%: 250 - 500 g/hl		Después de la floración.
	Torque (*Taphrina deformans)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 500 g/hl		1) En otoño, a la caída de las hojas. 2) Al hincharse las yemas. Precaución: no aplicar durante el período de plena floración.
Floricultura	Viruela de la violeta (*Cercospora violae)* Viruela del clavel (*Septoria dianthi)* Viruela del crisantemo (*Septoria leucanthemi)*	PC 84%: 300 - 400 g/hl		En los tratamientos preventivos desde que las plantas desarrollan sus primeras hojas o desde que los gajos han arraigado, repitiendo cada 15 - 20 días hasta antes de la floración.
Frutilla	Tizón de la frutilla (*Dendrophoma obscurans)*	PC 50%: 450 - 550 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl	14	Idem viruela.
	Viruela de la frutilla (*Ramularia tulasnei)*			Antes de la floración, cuando las plantas son pequeñas, repitiendo cada 15 - 20 días.
Haba	Roya del haba (*Uromyces viciae-fabae)*	PC 50%: 450 - 720 cm3/hl PC 84%: 250 - 400 g/hl	7	Idem antracnosis de la arveja.
Ornamentales	Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)* Viruela del clavel (*Septoria dianthi)* Viruela del crisantemo (*Septoria leucanthemi)*	PC 84%: 0,4 - 0,6 kg/hl		El caldo resultante de la dilución, debe ser asperjado al follaje.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	PC 50%: 550 - 720 cm3/hl PC 84%: 300 - 400 g/hl	7	1) Antes de la floración. 2) Después de la floración. 3) Siguientes: a los 15 y a los 25 - 30 días de la segunda. En zonas con condiciones climáticas favorables a la aparición de la enfermedad, recorrer el cultivo diariamente. Pulverizar con altos volúmenes de agua, para cubrir adecuadamente el follaje; repetir las curas después de cada lluvia.
Pimiento	Viruela del pimiento (*Cercospora capsici)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl	14	Pulverizaciones cada 15 - 20 días desde que se forman las hojas.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)*	PC 50%: 550 - 720 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl	7	1) En plantas de 15 - 20 días.
		PC 50%: 720 - 1080 cm3/hl PC 84%: 300 - 400 g/hl		2) Siguientes: cada 15 - 20 días hasta antes de la floración y sobre el fruto verde, después.
Remolacha	Viruela de la acelga y remolacha (*Cercospora beticola)*	PC 50%: 720 cm3/hl PC 84%: 400 g/hl		1) Al aparecer los cotiledones. 2) Al trasplante. Repetir cada 10 días.
Rosales	Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)*	PC 50%: 550 - 720 cm3/hl PC 84%: 400 g/hl		Al iniciarse la brotación. Repetir cada 15 - 20 días en caso de ataque.
Tomate	Mildiu del pimiento y del tomate (*Phytophthora capsici)*	PC 50%: 450 - 550 cm3/hl PC 84%: 300 - 400 g/hl	14	Desde que las plantas tienen 10 - 12 cm repitiendo cada 7 - 10 días.
	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	PC 50%: 250-300 cm3/hl PC 84%: 250 - 300 g/hl		1) En almácigo, apenas aparecen las primeras hojas. 2) Después de 10 días del trasplante. 3) Siguientes: repitiendo cada 20 días según condiciones del ambiente y sobre el fruto verde.
Vid	Antracnosis de la vid (*Sphaceloma ampelinum)* Peronóspora (*Plasmopara viticola)*			Desde que los brotes tienen 8 - 10 cm de largo cada 15 - 20 días, suspendiéndose durante la floración, continuando después de la floración y hasta que los frutos se pongan "pintones".

Información General:

Modo y mecanismo de acción: el ión cúprico reacciona con las enzimas celulares del patógeno, provocando la desnaturalización de las proteínas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Máquinas pulverizadoras manuales o con motor, nebulizadoras de frutales.
Puede ser aplicado con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen, manuales o a motor, o con nebulizadoras de frutales. Se deben aplicar el volumen de agua necesario para lograr un correcto mojado de toda la planta a tratar. Se debe lograr una cobertura de 50-70 gotas/cm2.

Compatibilidad: Es compatible con aceites de verano y/o de invierno. Es incompatible con polisulfuro de calcio, dinitros, mercuriales, dimetoato, thiram y otros productos de fuerte reacción alcalina. Se aconseja ensayar previamente las combinaciones elegidas.

Restricciones de uso: NO aplicar en durazneros durante el período vegetativo. Repetir el tratamiento en caso que una lluvia lave el producto.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego adsorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): M1(FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su ingestión, inhalación y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar ropa protectora adecuada, careta, antiparras, botas y guantes de goma. Finalizado el trabajo, lavarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

Información Toxicológica:

Del formulado al 84%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50:1.000 - 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL50: > 30 mg/l
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	No irritante.
Sensibilización dermal:	Ligeramente sensibilizante.

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales. No es irritante para la piel. No es irritante para los ojos.

Del formulado al 84% RECOP:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL50: > 240mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante.
Irritación ocular:	Leve irritante.
Sensibilización dermal:	No sensibilizante.

Del formulado al 50%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL50: 4,69 mg/l (4 h)
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	Medianamente irritante.
Sensibilización dermal:	Puede ser sensibilizante.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces y moderadamente tóxico para aves. Es inocuo para el ganado. Ligeramente tóxico para abejas.

Riesgos ambientales para PF al 84% RECOP:

Toxicidad para Aves:	Prácticamente no toxico.
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no toxico.
Toxicidad para peces:	Moderadamente toxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CAURIFIX S	BASF ARGENTINA	30425	WP	50%	IV
CAURIFIX WG	BASF ARGENTINA	33597	WG	84%	III
RECOP	ATANOR S.C.A	33433	WP	84%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.