Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

OXIDEMETON METIL

Nomenclatura Química:
oxidemetón metil: S-[2-(etilsulfinil)-etil]-0,0-dimetil fósforotioato.
Clasificación Química: organofosforado.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*	500 - 1000 cm3/ha	45	Iniciar el tratamiento cuando en plantas de 3 a 4 hojas se encuentren 5 a 8 pulgones por hoja y en plantas con más de 6 hojas con 20 a 30 pulgones.
Avena común Cebada Centeno Trigo	Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	250 cm3/ha		Cuando se observen los primeros manchones producidos por la plaga. En pulverizaciones aéreas aumentar un 10% la dosis.
Batata o boniato Papa Zanahoria	Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón verde del alcaucil (*Capitophorus eleagni)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	500 - 1000 cm3/ha	14	Cuando se observan las primeras colonias, repitiendo cuando se necesario hasta tres semanas antes de la cosecha.
Cítricos o citrus	Acaro de la lepra explosiva (*Brevipalpus obovatus)* Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)* Pulgón de los citrus (*Toxoptera aurantii)* Pulgón verde de los citrus (*Aphis citricola)*	100 cm3/hl	28	Al aparecer la plaga, hacer aplicaciones con no menos de 1500 l de agua/ha.
Frutales de carozo	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*			Al aparecer la plaga, hacer aplicaciones con no menos de 1500 l de agua/ha.
Frutales de pepita	Acaro tejedor (*Tetranychus urticae)* Agalla de la Hoja del Peral (*Eryophyes pyri)* Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)* Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)* Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*			
Hortalizas Melón	Pulgón de la papa (*Macrosiphum euphorbiae)* Pulgón verde del alcaucil (*Capitophorus eleagni)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*	500 - 1000 cm3/ha	21	Cuando se observan las primeras colonias, repitiendo cuando se necesario hasta tres semanas antes de la cosecha.
Nogal	Erinosis del nogal (*Eriophyes tristriatus)*	100 cm3/hl	28	Al aparecer la plaga, hacer aplicaciones con no menos de 1500 l de agua/ha.
Ornamentales	Pulgón del rosal (*Macrosiphum rosae)* Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (*Myzus persicae)*			Iniciar los tratamientos cuando se observen las primeras colonias de la plaga. Aplicar suficiente cantidad de dilución para lograr una buena cobertura foliar.

Información General:

Este producto actúa sobre insectos y ácaros inhibiendo la colinesterasa.

Equipos de aplicación: se puede aplicar con equipos convencionales provistos de picos pulverizadores para insecticidas y que aseguren un caudal mínimo por hectárea entre 80 y 120 litros. En frutales el caudal deberá oscilar entre 2000 y 3500 l/ha.
Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas usuales.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

NO mezclar con productos de reacción alcalina.

Derrames:
En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con arena u otro material inerte y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición de acuerdo a la legislación local vigente. Evitar la contaminación del agua riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 50 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: 130 mg/kg

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Muy tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.