PENCONAZOLE

Marcas comerciales: TOPAS.

Nomenclatura Química:
penconazole:1-(2-(2,4-diclorofenil)-N-pentil)-1H-1,2,4-triazol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Duraznero	Oídio del duraznero (*Sphaerotheca pannosa. anamorfo: oidium leucoconium)*	30 cm3/hl	21	Aplicar después del cuaje y antes que los frutos alcancen 1 cm de diámetro. En cultivares muy sensibles repetir cada 15 días hasta enero. No utilizar caudales menores de 2000 l/ha.
Manzano Peral	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	20 cm3/hl		Primera aplicación: inicio de floración y con las primeras hojas desarrolladas. Segunda aplicación: a la caída de los pétalos. De ser necesario, realizar una tercera aplicación a los 15 a 20 días de la segunda. Realizar aplicaciones posteriores según observación.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*			Acción curativa: Realizar aplicaciones de penconazole solo, dentro de las 96 horas de emitido el aviso de alarma. Se obtendrá protección por un período de hasta 7 días de emitido el aviso de alarma. Las aplicaciones deberán comenzar en el estado de puntas verdes, repitiéndose en los intervalos indicados, de acuerdo con la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas. En caso de existir un servicio de alarma local, seguir sus indicaciones. NO utilizar caudales menores de 2000 l/ha.
		25 cm3/hl + 75 g/hl de mancozeb 80%.		Acción preventiva/curativa: Utilizar en mezcla con mancozeb y aplicar con un intervalo de 10 a 14 días según la intensidad, aplicado dentro de las 96 horas de emitido el aviso de alarma. Las aplicaciones deberán comenzar en el estado de puntas verdes, repitiéndose en los intervalos indicados, de acuerdo con la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas. En caso de existir un servicio de alarma local, seguir sus indicaciones. NO utilizar caudales menores de 2000 l/ha.
	Sarna del peral (*Venturia pirina)*	25 cm3/hl		Acción curativa: Realizar aplicaciones de penconazole solo, dentro de las 96 horas de emitido el aviso de alarma. Se obtendrá protección por un período de hasta 7 días de emitido el aviso de alarma. Las aplicaciones deberán comenzar en el estado de puntas verdes, repitiéndose en los intervalos indicados, de acuerdo con la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas. En caso de existir un servicio de alarma local, seguir sus indicaciones. NO utilizar caudales menores de 2000 l/ha.
		25 cm3/hl + 75 g/hl de mancozeb 80%.		Acción preventiva/curativa: Utilizar en mezcla con mancozeb y aplicar con un intervalo de 10 a 14 días según la intensidad, aplicado dentro de las 96 horas de emitido el aviso de alarma. Las aplicaciones deberán comenzar en el estado de puntas verdes, repitiéndose en los intervalos indicados, de acuerdo con la presión de la enfermedad y las condiciones climáticas. En caso de existir un servicio de alarma local, seguir sus indicaciones. NO utilizar caudales menores de 2000 l/ha.
Melón Sandía Zapallo	Oídio de las cucurbitáceas (*Erysiphe cichoracearum)*	25 - 50 cm3/hl	15	La dosis más baja (25 cm3/100 litros de agua) es preventiva. Se pueden continuar las aplicaciones con un intervalo de 15 días entre cada aplicación. Si se detecta la presencia de la enfermedad, se debe aplicar la dosis más alta (50 cm3/100 litros de agua) y continuar luego con la dosis preventiva en aplicaciones cada 15 días.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	25 cm3/hl	28	Primera aplicación: con brotes de 10 - 15 cm de longitud y primeras hojas desarrolladas. Segunda aplicación: a los 14 días o al inicio de floración. Tercera aplicación: con el fruto del tamaño de un grano de pimienta. Realizar aplicaciones posteriores según observación de síntomas, hasta el cese del crecimiento de las ramas terminales.

Información General:

Fungicida sistémico, perteneciente a familia de los triazoles, que posee propiedades preventivas y curativas para el control de enfermedades en cultivos frutales y hortícolas. Controla patógenos que producen oídios en hojas y ramas jóvenes y reduce la producción de inóculo de estas enfermedades, disminuyendo las reinfecciones del año siguiente. También está recomendado para el control de la sarnas (Venturia spp.) que afectan manzanos y perales. El penconazole detiene el desarrollo de los patógenos a través de la interferencia de la biosíntesis de esteroles en las membranas celulares.

Gracias a su rápida penetración en los tejidos vegetales, no es lavado por lluvias. Además, no ejerce acción sobre insectos benéficos, por lo tanto puede ser recomendado en programas de control integrado.

Preparación: concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación. Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
-Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. Está recomendado para aplicaciones con equipos de mochila manuales o a motor y máquinas de arrastre de alto volumen. Se debe utilizar la cantidad de agua necesaria, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo. Evitar que se produzca escurrimiento del producto por exceso de agua.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Período de carencia: dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha, según el cultivo: vid: 28 días; manzana, pera y durazno: 21 días; zapallo, melón y sandía: 15 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
TOPAS® pertenece al grupo 3 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Resistencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. No debe ser mezclado con caldo bordelés ni polisulfuro de calcio. En caso de duda, realizar un ensayo de compatibilidad. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: =2574,1mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: 4000 mg/kg (rata)
CL50 inhalatoria: >5294 mg/m3 (ratas)

Leve Irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Solvente: Este producto contiene solventes aromáticos.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de 1 metro entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Moderadamente tóxico para abejas.
Respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación, por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación del producto, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Ligeramente tóxico para aves.
Evitar la presencia de aves en el área de aplicación y el contacto de las mismas con el producto. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOPAS	SYNGENTA AGRO	31228	EC	10%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.