POLISULFURO DE CALCIO

Nomenclatura Química:
polisulfuro de calcio: azufre de polisulfuro + azufre de tiosulfato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: inorgánico.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: acaricida y fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ciruelo	Bolsita del ciruelo (*Taphrina pruni)*	Según época. Ver información general.	28	1) Al hincharse las yemas con solución al 15%. 2) Cuando hayan caído los pétalos con solución al 2%.
Cítricos o citrus	Acaro de la lepra explosiva (*Brevipalpus obovatus)* Acaro del plateado (*Eutetranychus banksi)* Acaro del tostado, Plateado de los limones, Naranja negra (*Phyllocoptruta oleivora)* Cochinilla blanca (*Aspidiotus hederae)* Cochinilla blanca del duraznero (*Pseudaulacaspis pentagona)* Cochinilla coma (*Mytilococcus beckii)* Cochinilla de los helechos (*Pinnaspis aspidistae)* Cochinilla del delta (*Lecanium deltae)* Cochinilla hache (*Saissetia oleae)* Cochinilla harinosa de los citrus (*Pseudococcus citri)* Cochinilla negra circular de los citrus (*Chrysomphalus ficus)* Cochinilla roja australiana (*Aonidiella aurantii)* Cochinilla roja común (*Chrysomphalus dictyospermi)* Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*		30	Pulverizar a la caída de los pétalos y en febrero/marzo. En invierno, inmediatamente después de la poda o del raleo de limpieza. En primavera y verano al producirse los nacimientos de las ninfas.
Duraznero	Oídio del duraznero (*Sphaerotheca pannosa)*		28	1) Al hincharse las yemas foliares. 2) Al aparecer las puntas de los botones florales.
	Torque (*Taphrina deformans)*			1) De 8 a 10 días antes de la apertura de las yemas. 2) Al comienzo de la foliación.
Frutales	Arañuela parda (*Bryobia rubrioculus)*			Hacer el tratamiento en cuanto aparezca el primer ataque.
	Taladrillo de los frutales (*Scolytus rugulosus)*	8 - 15 l/hl		Pulverizar en los meses de invierno, con equipos de alta presión.
Frutales de carozo	Mal de la munición (*Stigmina carpophila)*			1) Inmediatamente después de la caída de las hojas. 2) Al hincharse las yemas.
	Podredumbre morena de los frutales (*Monilia cinerea)*	Según época.		1) Un poco antes de abrir el botón floral. 2) A la caída de la mayor parte de los pétalos. 3) De 15 - 20 días después. 4) Antes de que los frutos se pongan pintones.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*			1) En botón floral en dosis del 3%. 2) A la caída de los pétalos en dosis del 2%.
	Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)*			Pulverizar desde octubre a febrero, repitiendo cada 15 días con solución al 1%.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*			1) Antes que las yemas empiecen a hincharse. 2) Cuando se hinchen (pre-pink). 3) Al abrirse (pink). 4) A la caída de las 3/4 partes de los pétalos (petall-fall). Repetir cada 15 días y después de cada lluvia hasta la cosecha.
Membrillero	Mancha ocular del membrillero (*Entomosporium maculatum)*	8 - 15 l/hl		Pulverizar inmediatamente después de la poda invernal de chupones y excesos de ramas.
Peral	Agalla de la Hoja del Peral (*Eryophyes pyri)*			Pulverizar en invierno, después de la poda.

Rosales	Oídio del rosal (*Oidium leucoconium var. rosae)*	8 l/hl		1) Después de la poda invernal, pulverizar con solución al 8 % . Repetir al mes siguiente.
Tomate	Oídio del poroto (*Erysiphe pisi)*	2 l/hl	7	1) Cuando las plantas tienen entre 5 y 10 cm de altura. Repetir cada 10 - 15 días según condiciones del ambiente.
Vid	Erinosis de la vid (*Eriophyes vitis)*	8 - 15 l/hl	30	Pulverizar en invierno después de la poda.
	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	2 - 2,25 l/hl		1) Con brotes de 8 - 10 cm de largo. 2) Durante la floración. 3) 3 a 4 semanas después.

Información General:

Dosis:
En invierno: 8 - 15 litros en 100 litros de agua.
En primavera: 2,5 litros en 100 litros de agua.
En verano: 2 litros en 100 litros de agua.

Equipos: máquinas pulverizadoras manuales o con motor, nebulizadoras para frutales; preferentemente con agitadores. Emplear equipos que no contengan piezas de cobre y que originen suficiente presión.
Realizar la pulverización hasta llegar a punto de goteo. El volumen de agua empleado será variable, según la altura de la planta, desarrollo de la copa y cantidad de follaje, especie vegetal, cantidad de plantas/ha y la habilidad del operador para lograr una cobertura uniforme, sin exceder el punto de goteo.

Residuos: absorber los derrames con aserrín o tierra humedecida y disponer para posterior destrucción.

Compatibilidad: incompatible con dinitrocresoles y aceites.
NO mezclar con plaguicidas que se descompongan en medio alcalino.

Restricciones:
NO efectuar las pulverizaciones cuando las plantas están en flor, en horas de sol fuerte o con intenso rocío.

Repetir el tratamiento si llueve antes de los 3 días de efectuado el mismo.
Emplearse con cuidado en pulverizaciones de primavera y verano, cuando el follaje y las yemas son tiernos.

Dejar transcurrir un plazo de 30 días entre aplicaciones de polisulfuro y aceites.
NO aplicar en época en que los frutos toman color (manzana - uva).
Las variedades de manzano y peral sensibles al azufre tratadas sólo en prefloración.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): NC (IRAC/FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: no determinada.

Irritación dermal: Cáustico

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: No tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.