PROCIMIDONE

Marcas comerciales: SUMILEX 50 SC – SUMILEX TOP.

Nomenclatura Química:
procimidone: N-(3,5-diclorofenil)-1,2-dimetilciclopropano-1,2- dicarboximida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dicarboximida.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alcaucil Berenjena Pepino Pimiento Tomate Zapallito redondo Zapallo criollo	Marchitamiento de las hortalizas (*Sclerotinia sclerotiorum)*	75 - 100 cm3/hl	7	Cuando las condiciones ambientales favorecen la enfermedad o al observar los primeros síntomas.
Cebolla	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	100 cm3/hl		Apenas se observan los primeros síntomas, repetir cada 7 - 10 días.
Florales (Gladiolo y Rosales)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Podredumbre gris del gladiolo *(Botrytis gladiolorum)*			
Frutilla	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	75 - 100 cm3/hl		Aplicar con 10% de floración y en plena floración. Continuar a intervalos de 10 a 14 días.
Girasol (Cultivares moderadamente tolerantes a Sclerotinia)	Podredumbre del capítulo del girasol (*Sclerotinia sclerotiorum)*	1000 cm3/ha	28	Condiciones predisponentes: durante la floración, días de lluvia o de alta humedad relativa acompañada con temperaturas moderadas a frescas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Aplicación (es) preventiva (s): al principio y/o al final de floración. Principio de floración cuando comience la apertura de las flores liguladas amarillas del borde externo del capítulo. Fin de floración: cuando las flores liguladas del borde externo del capítulo comiencen a marchitarse.
		1400 cm3/ha		Aplicación curativa: cuando en ataques leves a moderados, bajo condiciones ambientales favorables para el desarrollo de Sclerotinia, en el envés del capítulo, en el punto de inserción con el tallo se observe una mancha de color castaño y de consistencia blanda. De ser necesario y como tratamiento de rescate, la aplicación se puede realizar hasta diez días después de la floración.
Lechuga	Marchitamiento de las hortalizas (*Sclerotinia sclerotiorum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	100 cm3/hl	7	Después del trasplante cada 15 a 20 días o apenas se observan los primeros ataques de la enfermedad.
Melón	Podredumbre de las raíces (*Sclerotium rolfsii)*	100 - 150 cm3/hl	14	Al iniciarse el ataque según necesidades hacer aplicaciones a intervalos de 10 a 14 días.
Vid (Para vino)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	75 - 100 cm3/hl	28	Primera aplicación: antes de la compactación de los racimos. Segunda aplicación: al comenzar el envero. Tercera aplicación y siguiente: efectuar pulverizaciones cuando el clima favorezca el desarrollo de la enfermedad.

Información General:

Modo de acción:
Actúa preventivamente inhibiendo la germinación de las esporas y bloqueando el micelio; curativamente frenando la propagación del hongo. Actúa principalmente sobre Botrytis cinerea y ejerce un excelente control de las cepas resistentes a los benzimidazoles.

No se encontraron efectos adversos en la calidad del vino en vides tratadas con este producto.
No existen diferencias significativas en su eficacia biológica, ya sea que llueva o no después de haberse secado el producto aplicado. Para mayor efectividad del tratamiento es recomendable el agregado de un coadyuvante, según lo indicado en la etiqueta.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN: Llenar con agua el tanque de la pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de la capacidad. Con los agitadores en movimiento verter en el tanque la cantidad de producto a utilizar. Completar la carga con agua y seguir agitando hasta homogeneizar la suspensión.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Para el tratamiento en cultivos florales, uva para vino y cultivos hortícolas se emplean equipos de alto volumen, realizando la pulverización hasta llegar a punto de escurrimiento o punto de goteo. En aplicaciones terrestres sobre girasol, cuando la altura del cultivo lo permita, se debe utilizar equipos adecuados provistos de barra pulverizadora de alto despegue de modo tal que alcancen una altura de 30- 40 cm. sobre los capítulos en floración. Trabajando con una presión de 3 bar, aplicar un volumen de 150-220 litros/ha. En otras situaciones dejar marcadas previamente las huellas por donde deberá desplazarse el equipo pulverizador a fin de evitar daños mecánicos.
En aplicaciones aéreas el volumen recomendado no debe ser inferior de 20 litros/ha. El equipo deberá ser calibrado para lograr una cobertura de 30-50 gotas/cm2 y con un tamaño de gotas de 200-300 micrones.

RECOMENDACIONES DE USO: Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor a 40 %, Viento mayor a 15 KPH.

RESTRICCIONES DE USO:
Período de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha es de: Girasol y uva para vino 28 días; Melón 14 días; Frutilla, Tomate, Alcaucil, Berenjena, Pepino, Lechuga, Pimiento, Zapallito, Zapallo y Cebolla 7 días. No aplicar sobre cultivos para uva de mesa.
Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.
En caso que el cultivo o subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: Puede usarse mezclado con la mayoría de los plaguicidas en uso, excepto aquellos fuertemente alcalinos, como el caldo bordelés, poli sulfuro de calcio etc. Se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad de la mezcla en pequeña escala, y consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Fitotoxicidad: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado
DL50 oral aguda: > 2000 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda > 2000 mg/kg (rata).
CL50 inhalaciòn > 1.3 mg/l (rata).

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

IDA para el hombre: 0,1 mg/kg
Antídoto: no se conoce uno específico.
Para mayor información ver el capítulo "Emergencias médicas por Productos Fitosanitarios", especialmente el tema fungicidas dicarboximidas.

Riesgos ambientales:
Virtualmente no tóxico para abejas.
Prácticamente no tóxico para aves.
Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos, evite contaminar estanques y fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SUMILEX 50 SC	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	33395	SC	50%	III
SUMILEX TOP	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41480	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.

Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.