PROCLORAZ

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS TRITAC.

Nomenclatura Química:
procloraz: 1-N-propil-N-[2(2,4,6-triclorofenoxi)etil]carbamoil imidazol.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazol.
Acción: preventiva, curativa y erradicante.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Cabeza negra (*Helminthosporium allii)* Carbonilla (*Aspergillus niger)* Mancha herrumbre (*Fusarium oxysporum var. cepae)* Podredumbre verde (*Penicillum spp.)*	420 cm3/hl (Tiempo de inmersión: 15 minutos) 840 cm3/hl (Tiempo de inmersión: 5 minutos)		El producto es aplicado previo a la siembra. Se sumergen las semillas de ajo durante el tiempo establecido en la solución acuosa. Una vez que están secas las semillas, están listas para su siembra.
Cítricos o citrus (Naranja, Limon, Pomelo, Mandarina)	Moho azul de los citrus (*Penicillium italicum)* Moho verde de los citrus (*Penicillium digitatum)*	100 - 150 cm3/hl		Post-cosecha: en baños de frutas. La inmersión debe realizarse inmediatamente después de la cosecha durante 1 o 2 minutos.
		450 - 650 cm3/hl		Post-cosecha: spray con cera.
Trigo	Golpe blanco del trigo (*Giberella zeae)*	1,0 l/ha	40	Desde el inicio de la antesis hasta que el 50% de la misma se presente en las espigas.

Información General:

Fungicida que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en las células del hongo patógeno y no le permite formar su membrana celular. De esta manera el micelio resulta destruido y ocasiona la muerte del hongo. Posee una gran acción de penetración y de sistemia localizada, resultado de la doble acción curativa y erradicante, además de la preventiva.

Técnicas de aplicación:
Citrus (post-cosecha):
Diluciones en agua: añadir el volumen de producto, a por lo menos, 10 volúmenes de agua. Agitar enérgicamente y luego completar con agua el volumen deseado; agitar nuevamente. La emulsión será estable durante 8 horas y luego de éste plazo, agitar otra vez.
Diluciones en ceras al agua: añadir una parte del producto a 10 partes de agua agitar hasta obtener una emulsión lechosa que luego es agregada a la cera al agua, agitándose durante, por lo menos, 15 minutos a 1500 rpm. Mantener esta agitación moderada durante la aplicación del preparado cera + procloraz.

Trigo:
La aplicación preventiva foliar debe realizarse en antesis, desde el inicio hasta mediados de ese estado (50%).
La aplicación debe realizarse con máquinas terrestres que arrojen volúmenes no menores a los 200 l/ha de caudal, con un número de impactos de 40 - 60 gotas por centímetro cuadrado.

Restricciones de uso:
Citrus: no tiene tiempo de carencia (TC) en su uso posicionado post cosecha.
Trigo: dejar transcurrir 40 días entre aplicación y cosecha.

Compatibilidad: no se conocen incompatibilidades con los productos utilizados normalmente en post cosecha.
Inactivación: mojar con soda cáustica al 10% (1 kg en 10 litros de agua).

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 4,99 mg/l

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Irritación dermal: Moderado irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Evitar la contaminación de aguas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS TRITAC	ADAMA ARGENTINA SA	32571	EC	45%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.