PROPAMOCARB

Marcas comerciales: PREVICUR N - PROMESS - PROPLANT.

Nomenclatura Química:
propamocarb: carbamato de propil 3-(dimetilamino) propil clorhidrato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: carbamato.
Acción: sistémica con acción fungistática.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cucurbitáceas	Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)*	250 cm3/hl o 2,0 l/ha	3	Tratar ni bien aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Repetir cada 10 a 14 días.
Hortalizas Ornamentales Viveros (*)	Hongo del suelo (*Phytophthora citrophthora)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae)* Mildiu de las crucíferas (*Peronospora parasitica)* Mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis)* Mildiu del ajo y la cebolla (*Peronospora destructor)*	Según momento.	14	Almácigos: Inmediatamente después de la siembra utilizar 250 cm3/100 l (0,25%). De esta solución aplicar 2,0 - 4,0 l/m2. Tratamiento de tierra: Para almácigos, invernáculos y contenedores utilizar 300 - 400 cm3/20 l/m3. Aplicar en camadas y mezclar en forma homogénea. Tratamiento de bulbos: Antes de plantar, sumergir los bulbos durante 20 minutos en una solución con 300 cm3/100 l (0,3%). Esquejes y estacas: Antes de plantar para tratamiento del suelo. Preparar 250 cm3/100 l (0,25%) y utilizar 2,0 - 4,0 l/m2 Plantas en maceta: Preparar 150 - 200 cm3/100 l (0,15 - 0,2%) y utilizar 50 - 250 cm3 de la solución por maceta según tamaño. Plantaciones: Preparar 250 cm3/100 l y utilizar 100 cm3 de solución por planta. Aplicar alrededor del cuello.
Lechuga	Mildiu de la lechuga (*Bremia lactucae)*	250 cm3/hl o 1,5 - 2,0 l/ha		Comenzar a tratar si las condiciones del tiempo favorecen el desarrollo de la enfermedad. Repetir cada 10 a 14 días.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,0 o 2,0 l/ha	3	Iniciar los tratamientos si las condiciones del cultivo son favorables a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días. Dosis menor al inicio del cultivo, aumentando la dosis a medida que se desarrolla la plantación hasta dosis máxima en el final. Se recomienda la mezcla con mancozeb 80% en la dosis de 1,5 a 2,0 kg/ha. Repetir cada 10 a 14 días dependiendo de la presión de la infección.
Pimiento Tomate		250 cm3/hl o 2,0 l/ha	14	Iniciar los tratamientos, si las condiciones del cultivo son favorables a la aparición de la enfermedad. Repetir cada 10 a 15 días.

(*) Lista de plantas ornamentales:
Azalea, Anthurium, Begonia, Calceolaria, Cereus, Clavel, Crisantemo, Cineraria, Clematis, Cyclamen, Delphinium, Euphorbia, Fuchsia, Gerbera, Gloxinia, Eliotrophium, Hibiscus, Hyacinthus, Iris, Lilium, Lobelia, Pelargonium, Peperomia, Petunia, Prímula, Ranunculus, Rosa, Saintpaulia, Senecio, Tagetes, Tulipán, Verbena, Viola, Zinnia, Cactus.

Información General:

Actúa sobre hongos Ficomicetes (Pythium, Phytopthora, Peronospora, Pseudoperonospora y Bremia) que atacan raíces, cuello, base del tallo y hojas.
Es absorbido por las raíces, por lo que debe ser aplicado con el suelo húmedo o posterior a un riego, para lograr una buena profundización del producto hasta la zona radical.
Puede ser mezclado con otros productos, salvo los de reacción alcalina y evitar también los fertilizantes y reguladores de crecimiento.
En suelos ácidos la acción inicial es más lenta pero su residual es mayor (3 a 8 semanas) que en los alcalinos.
Es necesario que el suelo esté bien húmedo al momento de aplicar para lograr una buena profundización del producto hasta la zona radicular.
Compatibilidad: es compatible con otros fungicidas que no sean de reacción alcalina. Para las mezclas de tanque se aconseja disolver primero en agua la cantidad requerida. No son aconsejables las mezclas con fertilizantes foliares y reguladores de crecimiento.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 28 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata hembra: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en ratas: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda en rata: > 7,9 mg/m3.

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Promes y Proplant:

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Antídoto: atropina.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves y peces.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PREVICUR N	BAYER	31165	SL	72,2%	III
PROMESS	UPL ARGENTINA S.A.	36202	SL	72,2%	III
PROPLANT	UPL ARGENTINA S.A.	33133	SL	72,2%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.