PROPICONAZOLE

Marcas comerciales: MELANITE - NOVEL - TILT 25 EC.

Nomenclatura Química:
propiconazole: 1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazole
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común	Roya anaranjada de la avena (*Puccinia corotana f. sp. avenae)*	500 cm3/ha	30	Aplicar cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas (pústulas).
Banano o plátano	Sigatoka amarilla (*Mycosphaerella musicola)*		10	Aplicar a intervalos de 16 a 20 días. La aplicación aérea deberá realizarse con 20 - 30 l/ha de agua. Puede ser mezclado con hasta 5 l/ha de aceites minerales, para mejorar su penetración en las hojas. Es compatible con otros fungicidas de reacción neutra.
Cebada cervecera	Escaldadura (*Rhynchosporium secalis)* Mancha en red (*Drechslera teres)*		30	Aplicar a partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas en la anteúltima hoja (hoja bandera -1).
Césped	Oídio de los cereales (*Erysiphe graminis)*	2000 - 4000 cm3/ha	(*)	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas con intervalos de 21 a 28 días. Los mejores resultados se obtienen aplicando propiconazole en forma preventiva, cuando existan condiciones ambientales altamente predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, y en la dosis de 2,0 l/ha. Para infecciones altas o aplicaciones correctivas utilizar la dosis de 4,0 l/ha. No cortar ni regar el área de césped tratado hasta que éste se encuentre completamente seco.
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)*	400 - 500 cm3/ha	30	Aplicar a la aparición de las primeras manchas foliares con intervalos de 14 a 21 días. La dosis más alta y el intervalo de aplicación más reducido deberán respetarse cuando existan condiciones ambientales altamente predisponentes para el desarrollo de la enfermedad.
Soja	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	500 - 750 cm3/ha		Aplicar al observar los primeros síntomas, antes del desarrollo de la enfermedad, con una severidad menor al 2% en las hojas del tercio inferior de la planta. Este producto debe ser aplicado antes del desarrollo de la enfermedad para el control de la roya de la soja. La roya de la soja es agresiva y de desarrollo muy rápido. Es importante monitorear las condiciones ambientales predisponentes y el desarrollo inicial de la enfermedad. No se recomienda aplicar este producto cuando la enfermedad ya se haya desarrollado dentro del cultivo. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten se deberá repetir el tratamiento a partir de los 14 días.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	500 cm3/ha		Aplicar cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas (pústulas o manchas foliares). En variedades susceptibles a la roya y ante condiciones climáticas predisponentes, se recomienda hacer una aplicación preventiva entre fin de macollaje y encañazón.

(*) Se halla exento de período de carencia.

Uso: fungicida (post-cosecha).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cítricos (Naranja, Limón, Mandarina)	Podredumbres (*Geotrichum spp.)*	Inmersión y drench 240 cm3/hl En línea 360 a 480 cm3/hl	(**)	Post cosecha.

(**) Exento, uso posicionado

Información General:

Fungicida sistémico que puede ser utilizado en forma preventiva, protegiendo al cultivo antes de contraer la enfermedad, o curativa, evitando el desarrollo del patógeno, incluso cuando se observen los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Es un formulado de propiconazole, perteneciente al grupo de los triazoles. Posee movimiento sistémico que asegura su distribución dentro de la planta, siendo absorbido por hojas y tallos verdes, dependiendo de las condiciones climáticas y desarrollo del cultivo, y traslocado en forma ascendente por el xilema. Ejerce su acción sobre el hongo patógeno en el estadio de formación de la primera haustoria, deteniendo el desarrollo del mismo a través de la interferencia de la biosíntesis de esteroles de las membranas celulares.

Preparación: concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque. Corroborar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo a proteger. En aplicaciones terrestres, utilizar un volumen mínimo de agua de 200 l/ha, con presión de 60-80 lb/pulg2 y picos de cono hueco preferiblemente. En caso de realizar aplicaciones aéreas, utilizar un volumen mínimo de agua de 20 l/ha. No aplicar con vientos superiores a los 10 km/h, temperaturas superiores a 29 °C y humedad relativa menor al 60%.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Aplicar lejos de manantiales, cursos o fuentes de agua.

Instrucciones para el uso en post-cosecha:
Preparación: MELANITE es un fungicida de post-cosecha, que se presenta como líquido soluble fácilmente miscible en agua.
Equipos, Volúmenes y Técnicas de Aplicación:
La aplicación puede efectuarse por inmersión o bien por aspersión: con implementación apropiada dentro de la línea de procesamiento de frutos previo al empaque. Tratamientos preventivos en bins pueden ser efectuados por aspersión (duchas) o por inmersión de los bins completos. El tratamiento por aspersión, la fruta debe estar expuesta al pulverizado entre ½ y 1 minuto, regular la velocidad de la cinta a tal efecto o colocar 2 las de picos sucesivos, de manera de asegurar el correcto mojado. En tratamiento por inmersión, asegurar la misma durante 2 a 3 minutos. Mantener el caldo en movimiento y reponer periódicamente el fungicida y el agua utilizados.

Restricciones de uso:
Períodos de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir los siguientes días, según el cultivo: cebada cervecera, maní, soja y trigo: 30 días; banano: 10 días; césped: exento de período de carencia. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Tiempos de carencia: Melanite, exento, uso posicionado.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Para evitar la generación de resistencia, rotar con fungicidas de diferente modo de acción.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. Igualmente, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Prevención y manejo de resistencia (*)
El producto formulado pertenece al grupo 3 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.
(*) Para productos de SYNGENTA AGRO

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado (Novel y Tilt):
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: >1000 mg/m3

Irritación dermal: Irritante
Irritación ocular: Irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado (Melanite):
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2010 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2010 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: 9,46 mg/l

Clase III. Producto Ligeramente peligroso.
Leve irritante dermal (CUIDADO) Categoría IV.
Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV.
Aplicar tratamiento sintomático.

Irritación dermal: Irritante
Irritación ocular: Irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
Solvente: xileno (Novel y Tilt)

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Ligeramente tóxico para abejas (Novel y Tilt). Virtualmente no tóxico (Melanite).
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días, o entornar las piqueras durante la aplicación. Tomar la precaución de no contaminar fuentes de bebida con los remanentes del producto.
Prácticamente no tóxico para aves.
NO pastorear las áreas recientemente tratadas con el producto. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MELANITE	ADAMA ARGENTINA SA	32603	EC	25%	III
NOVEL	SYNGENTA AGRO	34048	EC	25%	III
TILT 25 EC	SYNGENTA AGRO	31223	EC	25%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.