PROPICONAZOLE + CYPROCONAZOLE

Marcas comerciales: ARTEA.

Nomenclatura Química:
propiconazole: 1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazole
cyproconazole: 2- (4-clorofenil)-3-ciclopropil- 1-(IH-1, 2, 4-triazol- 1- il) - butano -2-ol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	400 - 500 cm3/ha	60	Aplicar con los primeros signos de enfermedad (1 a 3% máximo de área foliar atacada por manchas o pústulas). Repetir la aplicación a las 3 a 5 semanas si la presión de la enfermedad continúa, o si una nueva enfermedad aparece. Usar la dosis mayor en variedades susceptibles y ante condiciones climáticas favorables. Hacer la aplicación preventivamente entre fin de macollaje y encañazón (entre los estadios 2.9 y 6.5 de la escala de desarrollo fenológico Zadoks et al.).
Cebada cervecera	Escaldadura (*Rhynchosporium secalis)* Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja (*Puccinia hordei)*		30	A partir de encañazón, cuando comiencen a aparecer los primeros síntomas en la anteúltima hoja (hoja bandera -1).
Soja	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	300 cm3/ha	35	La roya de la soja es agresiva y de desarrollo muy rápido. Ante la ocurrencia de condiciones predisponentes, monitorear el lote y realizar las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas, antes de que la enfermedad alcance el 2% de severidad en las hojas del tercio inferior de la planta. Luego de la primera aplicación, si las condiciones predisponentes persisten se deberá repetir la aplicación a partir de los 14 días. No se recomienda aplicar este producto cuando la enfermedad ya se haya desarrollado dentro del cultivo.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	400 - 500 cm3/ha	30	Aplicar con los primeros signos de enfermedad (1 a 3% máximo de área foliar atacada por manchas o pústulas). Repetir la aplicación a las 3 a 5 semanas si la presión de la enfermedad continúa, o si una nueva enfermedad aparece. Usar la dosis mayor en variedades susceptibles y ante condiciones climáticas favorables. Hacer la aplicación preventivamente entre fin de macollaje y encañazón (entre los estadios 2.9 y 6.5 de la escala de desarrollo fenológico Zadoks et al.).

Información General:

Fungicida foliar de acción sistémica. Es absorbido por hojas y tallos verdes, dependiendo de las condiciones climáticas y desarrollo del cultivo, y translocado en forma ascendente. El movimiento sistémico asegura su total distribución dentro de la planta. El producto formulado está compuesto por dos fungicidas del grupo de los triazoles, propiconazole y cyproconazole. Por su modo de acción, puede ser utilizado en forma preventiva, protegiendo al cultivo antes de contraer la enfermedad, o curativa, evitando el desarrollo del patógeno, aunque ya se observen los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Los mejores resultados se obtienen aplicando este producto cuando la enfermedad ya está presente y en los estadios tempranos de la misma. También puede ser recomendado en un Programa de Manejo Integrado de Plagas.

Preparación
Concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración previa realizada, directamente en el tanque.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
-Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20 - 30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo que a proteger. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Se debe aplicar en un volumen de 200 l/ha de agua, trabajando con una presión 60 lb/pulg2, para

lograr un buen mojado de las plantas. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de 20 - 30 l/ha.
NO aplicar con humedad relativa menor al 60%, temperaturas mayores a 29°C y vientos superiores a 10 km/h.
NO realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el follaje se encuentra mojado o ante posibilidades de lluvia.

Recomendaciones de uso
Puede ser utilizado en forma preventiva, protegiendo al cultivo antes de contraer la enfermedad, o curativa, evitando el desarrollo del patógeno, aunque ya se observen los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Los mejores resultados se obtienen aplicando cuando la enfermedad ya está presente y en los estadios tempranos de la misma.
NO aplicar este producto cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, ya que el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
NO realizar aplicaciones de este producto, ante probabilidades de lluvia dentro de las 4 horas, ya que el control puede no ser satisfactorio.

Restricciones de uso
Período de carencia
Dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha de trigo y cebada cervecera: 30 días, en soja: 35 días, y en avena: 60 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra.
NO aplicar este producto en mezcla con otros productos, sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, para comprobar la compatibilidad física y biológica de los componentes, y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda: > 2000 mg/kg (rata).
DL 50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata).

Moderado irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
Clase Inhalatoria III
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
La administración posterior de una suspensión de carbón activado y un purgante salino pueden favorecer la eliminación del tóxico y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

Riesgos ambientales:
Moderadamente tóxico para abejas.
Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación, por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación del producto, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ARTEA	SYNGENTA AGRO	33568	EC	25% + 8%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.