PROPIZAMIDA

Marcas comerciales: KERB 50 W.

Nomenclatura Química:
propizamida: 3,5 dicloro-N-1,1 dimetil-2-propinil benzamida.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzamida.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Agropiro (*Agropyron repens)* Aive (*Festuca hieronymi)* Alpiste (*Phalaris canariensis)* Avena guacha, Cizznia, Avena negra, Avena invasora (*Avena fatua)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cebadilla (*Bromus unioloides)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Gramilla (*Eragrostis sp)* Hierba mora (*Solanum nigrum)* Malva (*Malva spp.)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Mostaza negra (*Brassica nigra)* Ortiga (*Urtica urens)* Paja voladora (*Panicum spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto miel (*Paspalum dilatatum)* Poa (*Poa annua)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Ryegrass (*Lolium spp.)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyos colorados (*Amaranthus spp.)*	1,5 - 3,5 kg/ha	(*)	Implantación del cultivo: Se aplicará inmediatamente después de siembra y antes del nacimiento del cultivo. Aplicar en otoño o temprano en primavera con temperaturas bajas en suelo bien húmedo. Usar un caudal de no menos de 500 l/ha.
		2,0 – 3,0 kg/ha		Cultivo implantado: Se aplicará después del último corte con suelo húmedo. Su permanencia en el suelo con las relativamente bajas temperaturas de la estación, favorece la eliminación de las malezas que van naciendo.
Escarola Lechuga		2,5 - 3,5 kg/ha		Aplicar después de la siembra y antes del nacimiento de la maleza. El caudal por hectárea será de 500 litros. Se regará inmediatamente después del tratamiento.

(*) Uso posicionado.

Información General:

Herbicida selectivo pre y post-emergente temprano que actúa inhibiendo la división celular.
Controla una amplia gama de malezas gramíneas y latifoliadas.
Su persistencia en el suelo requiere temperaturas relativamente bajas.
Con temperaturas altas se volatiliza rápidamente.
Los mejores resultados se obtienen irrigando el suelo inmediatamente después de su aplicación.

Derrames:
En cualquier caso crear una barrera de contención para el derrame; evitar que el material tome contacto con cloacas, cursos de agua o áreas bajas.
Producto sin preparar: barrer lentamente y recoger con pala, evitando generar polvo. No usar agua.
Caldo de pulverización: cubrir el producto con un material adsorbente (arena o tierra), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanía de plantas o árboles, remover 5 cm de tierra superficial después de la limpieza inicial.
En todos los casos, el material recogido se colocará en tambores y se enviará para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal.
Barbijo.
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal en rata: > 2000 mg/kg.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces y organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KERB 50 W	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30068	WP	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.