PROSULFURON

Marcas comerciales: PEAK 75 WG.

Nomenclatura Química:
prosulfuron:N-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)-amino]carbonil]-2-(3,3,3-trifluoropropil)-benceno sulfonamida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz Sorgo	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Albahaca silvestre (*Gallingsoga spp.)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Campanilla (*Ipomoea purpurea)* Capiquí (*Stellaria media)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Hierba cana (*Senecio vulgaris)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Morenita (*Kochia scoparia)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium spp.)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Violeta silvestre (*Viola spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	30 g/ha	(*)	Post emergencia temprana. Aplicar cuando el cultivo tiene de 3 a 5 hojas y las malezas se encuentran en estado de cotiledón hasta 6 hojas. Aplicar siempre con humectante no iónico en una concentración de 0.2% (200 cm3/100 litros de caldo).
Trigo		25 g/ha + 200 cm3 de dicamba 57,71% p/v		

(*) Se halla exento de periodo de carencia para el uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida post-emergente de acción sistémica, selectivo para los cultivos de maíz, sorgo y trigo. Ejerce control sobre malezas anuales de hoja ancha. Se absorbe a través de las hojas y las raíces, y es traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas. Pocos días después de la aplicación, las plantas presentan coloración amarillenta, sobre todo en las hojas superiores, que luego tornan a violáceo, hasta marchitamiento, necrosis y muerte de la planta.
Para lograr un buen resultado en el control de malezas, es importante que las mismas se encuentren en estado de activo crecimiento, con un tamaño adecuado, y que se presenten buenas condiciones tanto de humedad de suelo, como de temperatura ambiente. En el cultivo de maíz, se recomienda el uso de un herbicida pre-emergente que controle gramíneas, como S-metolacloro 96%, para completar el espectro de control.

Preparación: formulación de gránulos dispersables, que se mezcla fácilmente con agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa.
- Corroborar la correcta dispersión del producto.
- Una vez que el producto esté bien disuelto y en suspensión, agregar la cantidad de aditivo apropiada.
- Completar el tanque con agua, hasta el volumen deseado. Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.

- Usar el caldo preparado dentro de las 24 horas de la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Utilizar siempre agua limpia.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo y malezas. Para aplicaciones terrestres se recomienda aplicar un volumen de 150 l/ha, con presión de 2,8 - 3,5 bar (40-50 lb/pulg2) y picos de abanico plano (8002; 8003; 11002; 11003). Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de 15-20 l/ha de agua.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Aditivos: este producto debe aplicarse siempre con humectante no iónico en una concentración de 0.2% (200 cm3/100 l de agua).

Recomendaciones de uso: prosulfuron debe ser aplicado en post-emergencia de la maleza, cuando esta se encuentra en activo crecimiento, y con buenas condiciones de humedad del suelo.
NO es recomendable realizar la aplicación cuando las malezas estén sufriendo stress hídrico, haya vientos superiores a 10 km/hora y/o rocío sobre el follaje.

Restricciones de uso:
Período de carencia: se halla exento de periodo de carencia para el uso posicionado como herbicida. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotación de cultivos: entre la aplicación y la siembra de girasol deben transcurrir por lo menos 12 meses.
NO debe sembrarse girasol de segunda luego de un trigo tratado con prosulfuron. Luego de cosechado el cultivo tratado, no existen restricciones para sembrar otros cultivos, siguiendo las prácticas agronómicas normales. En caso de pérdida del cultivo tratado, solamente se puede resembrar maíz, sorgo o trigo. Se recomienda dejar transcurrir 4 semanas desde la aplicación hasta la nueva siembra.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: NO aplicar prosulfuron junto con insecticidas organofosforados. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: bajo condiciones normales, este producto no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. En condiciones de estrés, así como períodos prolongados de lluvia y temperaturas bajas, puede ocurrir algún daño transitorio. Varias líneas de producción de semillas de maíz han demostrado baja selectividad a prosulfuron, lo mismo que variedades especiales como maíz pisingallo. Estos aspectos deben ser considerados localmente antes de recomendar el uso de prosulfuron. En todos los híbridos registrados el producto puede ser utilizado sin restricciones.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

DL 50 oral aguda: Entre 1000 mg/kg y 2000 mg/kg
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (Conejo)
CL 50 inhalación aguda >5.05 mg/L

No irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda
En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarreas. No es irritante en piel y mucosas.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para peces, pero extremadamente tóxico para algas.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar estanques ni cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Moderadamente tóxico para aves.
Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PEAK 75 WG	SYNGENTA AGRO	33095	WG	75%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.