PYRACLOSTROBIN

Marcas comerciales: COMET.

Nomenclatura Química:
pyraclosrobin: metil-N[[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il] oxi}-o- tolil]-N-metoxicarbamato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Alternaria (*Alternaria helianthi)* Escudete negro (*Phoma oleracea)* Roya blanca del girasol (*Albugo tragopogonis)* Roya negra del girasol (*Puccinia helianthi)*	300 cm3/ha	75	R1-comienzos de floración: el capítulo comienza a separarse de las hojas más jóvenes, las brácteas se pueden distinguir de las hojas del follaje.
Poroto	Cercospora (*Cercospora canescens)* Mancha angular del poroto (*Phaeoisariopsis griseola)* Mustia hilachosa (*Rhizoctonia microsclerotia)* Roya del poroto (*Uromyces appendiculatus)*	0,2 l/ha + 0,5 l/ha de carbendazim 50% o 0,3 l/ha	30	Aplicar en floración y de ser necesario repetir a los 20 días al detectar los primeros síntomas o si las condiciones ambientales son predisponentes para las enfermedades (alta humedad ambiente o precipitaciones abundantes).
Limonero Naranjo Pomelo	Mancha negra de los cítricos (*Phyllosticta citricarpa)*	0,2 l/1000 l agua	15	1ª Aplicación: desde mediados de octubre o noviembre (según condiciones predisponentes*) 0,2 l + mancozeb (80%) 2,0 kg. 2ª Aplicación: 30 días de la 1ª aplicación, mancozeb (80%) 2,0 kg. 3ª Aplicación: 30 días de la 2ª aplicación 0,2 l + oxicloruro de Cu (85%) 3,0 kg. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,5%. Dosis expresadas cada 1000 l de agua.
Vid	Oídio de la vid (*Uncinula necator)*	20 cm3/100 l de agua (200 cm3/ha)		Realizar la primera aplicación con brotes de 5 a 10 cm, y repetir a intervalos de 15 a 20 días, en caso de necesidad. Manejo de resistencia: se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones en el ciclo del cultivo. En caso de necesidad de un mayor numero de aplicaciones, se recomienda alternar con otros fungicidas específicos de diferente modo de acción.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)* Tizón del maíz (*Exserohilum turcicum)*	400 cc/ha	30	Aplicar preventivamente para estas enfermedades (monitorear desde 6 hojas hasta inicio de floración).
Mandarino Naranjo	Sarna de los Citrus (*Elsinoe australis)* Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma australis)*	0,2 l/1000 l agua	15	1ª Aplicación (inicio de floración): 0,2 l. 2ª Aplicación (plena floración): aplicar uno de los siguientes productos: oxicloruro de Cu (85%) 3,0 kg, mancozeb 80%, 2,0 kg carbendazim 50% 1,0 l ó ditianon 75% 0,9 l. 3ª Aplicación (¾ caída de pétalos): aplicar uno de los siguientes productos: oxicloruro de Cu 85% 3,0 kg, mancozeb 80% 2,0 kg carbendazim 50% 1,0 l ó ditianon 75% 0,9 l. En cultivo de limón agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1000 l de agua.
Limonero	Sarna del naranjo agrio (*Elsinoe fawcettii)* Sarna del naranjo agrio (*Sphaceloma fawcettii)*			
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	400 cc/ha	30	Iniciar los tratamientos a la aparición de las primeras manchas. Realizar la segunda aplicación con un intervalo de 21 días.

(*) Condiciones predisponentes para Mancha negra de los cítricos: humedad sobre los frutos durante más de 15 horas y temperaturas superiores a 18°C.

Información General:

Fungicida sistémico local, de la familia de las estrobilurinas. Fungicida de efecto preventivo, curativo y de acción prolongada.
La sustancia activa forma un depósito fuertemente adherido a la capa cerosa de la hoja, la razón de esto es la combinación de tres factores, la sustancia activa es altamente lipofílica, tiene una presión de vapor baja y su solubilidad en agua es baja. Pocos minutos después de la aplicación una parte de la sustancia activa solubilizada penetra al interior de la hoja. La sustancia activa se difunde en el interior del tejido vegetal a través de distancias cortas. Consecuentemente se manifiesta una liberación continua de sustancia activa durante un período que dura varias semanas. Luego también se acumula en las zonas que no fueron directamente alcanzadas por el fungicida, pero que forman parte de la capa cerosa de la epidermis.
La intensidad de acción del pyraclostrobin, es el producto de tres factores: el lugar de acción, la cadena de respiración en la mitocondria; la disponibilidad de la sustancia activa en el lugar de acción en forma rápida y persistente; y la extraordinaria alta acción intrínseca medida en mitocondrias de levaduras en condiciones estándar.

Por encima de esto el principio activo pyraclostrobin tiene una acción fisiológica positiva en la planta, interviniendo en el proceso de formación de los granos y frutos, mejorando su calidad y rendimiento.
Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a fungicidas se recomienda aplicar este producto en mezcla o alternado con otros fungicidas registrados con distinto modo de acción.

Preparación: importante agitar bien el envase antes de usar. El producto debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llénese el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de producto al tanque del pulverizador. Complete el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.

Equipos de aplicación: utilizar equipos de pulverización provistos de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.
En plantaciones de cítricos y en el cultivo de vid: se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de algo o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas, pulverizando hasta punto de goteo. En el cultivo de poroto, girasol, maní y maíz: aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg2. No utilizar volúmenes inferiores a 200 l/ha. Aplicaciones aéreas: el volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
En plantaciones de citrus y en el cultivo de vid: se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo.

Compatibilidad: el producto es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en plantaciones de limonero, mandarino, naranjo, poroto y vid.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar protección ocular adecuada, antiparras o anteojos protectores, protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.
Evitar la inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos.
No comer, beber o fumar, durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora.
No pulverizar contra el viento. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (ratón)	DL 50: 200-500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: >1,14 mg/l < 5,3 mg/l
Irritación dermal:	Irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Primeros auxilios:
Ingestión: enjuagar la boca inmediatamente y beber abundante agua. Obtener asistencia médica.
Contacto con la piel: lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Obtener asistencia médica.
Contacto ocular: Lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.
Inhalación: retirar al aire fresco. Obtener asistencia médica.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COMET	BASF ARGENTINA	33776	EC	25%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.