PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE

Marcas comerciales: EPYCO SIGMA - OPERA - PLADOX - RENASTE.

Nomenclatura Química:
pyraclostrobin: metil-N[[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il] oxi}-o- tolil]-N-metoxicarbamato
epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 clorofenil)-2-(4-fluorofenil) –2-[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil]oxirane
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Roya del ajo (*Puccinia allii)*	1,0 l/ha	30	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o en forma preventiva, desde el estado fenológico: 10-11 hojas. Tener en cuenta la sensibilidad varietal: mayor en ajos morados o chinos. Son condiciones predisponentes a la enfermedad: primaveras frescas, lluviosas o con alta humedad relativa y formación de rocío.
Algodón	Alternaria (*Alternaria alternata)*	0,5	40	Monitorear a partir de inicios de floración y aplicar a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.
Arveja o alverja	Antracnosis de la arveja (*Ascochyta pisi)* Oidio (*Erisiphe poligoni)*	0,5 l/ha	39	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o en forma preventiva desde inicio de floración. En caso de reinfección aplicar nuevamente a los 14 días
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja (*Puccinia hordei)*	1,00	50	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Girasol	Escudo negro o Mancha negra del tallo (*Phoma macdonaldii)* Mancha de la hoja y tallo (*Alternaria helianthi)* Roya blanca del girasol (*Albugo tragopogonis)* Roya negra del girasol (*Puccinia helianthi)*	0,75 l/ha	69	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas, desde el estado R1 (estrella) hasta floración.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)*		30	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas (Monitorear desde 6 - 7 hojas hasta el inicio de la floración).
Maní	Viruela tardía del maní (*Mycosphaerella berkeleyi)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*			Iniciar los tratamientos a la aparición de las primeras manchas. Realizar la segunda aplicación con un intervalo de 28 días.
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha anillada (*Corynespora cassiicola)* Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Phomosis (*Diaporthe phaseolorum)*	0,5 l/ha	15	Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades de fin de ciclo y mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en R3.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar preventivamente en estadio de cultivo R3 - R4 (finales de floración, inicio de llenado de granos). Realizar la aplicación al inicio de floración (R1) de observarse síntomas de la enfermedad.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	1,0 l/ha	38	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Garbanzo	Rabia (Ascochyta rabiai)	0,5 - 0,75 l/ha	40	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o en forma preventiva desde inicio de floración. Emplear la dosis más alta en caso de alta presión de enfermedad y aplicaciones tardías. En caso de reinfección aplicar nuevamente a los 14 días.

Información General:

Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de trigo y cebada, para el control de roya del maíz, para el control de viruela temprana y tardía en el cultivo de maní, para el control de las enfermedades de fin de ciclo y roya asiática en el cultivo de soja, para el control de enfermedades foliares y de tallo del grupo de las denominadas de fin de ciclo en el cultivo de girasol, para el control de enfermedades foliares en el cultivo de arveja y garbanzo, para el control de roya en ajo y para el control de Alternaria en Algodón. Es un fungicida de efecto preventivo, curativo y erradicante. La base del control del producto está en la combinación de sus principios activos, pyraclostrobin + epoxiconazole. Pyraclostrobin: es una estrobilurina de última generación que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y Oomicetos. Posee acción prolongada. Efectos fisiológicos: El principio activo pyraclostrobin ejerce una acción fisiológica positiva en la planta, interviniendo en el proceso de formación de los granos, mejorando su calidad y rendimiento. El producto contiene también epoxiconazole un triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica y de larga residualidad, la combinación permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas con igual modo de acción que las estrobilurinas y contribuye al control fúngico. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de trigo, maíz, maní, soja ajo y girasol. Para mezclas específicas consultar con el departamento técnico de la empresa proveedora. En el cultivo de maní, bajo determinadas condiciones climáticas, y en mezclas de tanque con 2-4 DB, se pueden observar síntomas de fitotoxicidad superiores a los que comúnmente se observan con este herbicida, por lo que no recomendamos su mezcla. Diferir la aplicación del herbicida en más de 2 días.

Derrames:

Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Utilizar protección ocular adecuada, antiparras o anteojos protectores, protección facial, protección respiratoria, guantes de acrilonitrilo, pantalón largo, camisa de manga larga y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del formulado

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: 531 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: 2,3 mg/l 4 h

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante / Moderado irritante (Cuidado) CATEGORIA III. Causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con la piel y la ropa. (*)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

(*) Para el producto EPYCO SIGMA

Primeros auxilios: aplicar tratamiento sintomático.

Ingestión: no provocar el vómito. Si la persona afectada está consciente, beber 2-3 vasos de agua. Obtener asistencia médica.

Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón las zonas de la piel afectadas. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.

Contacto ocular: lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. No utilizar colirio. Consultar un oftalmólogo.

Inhalación: retirar al aire fresco. Si es necesario, obtener asistencia médica.

Riesgos ambientales: Producto virtualmente no tóxico para abejas, ligeramente tóxico para aves, extremadamente tóxico para peces. No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con el producto hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Para el producto EPYCO SIGMA:

Moderadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas o diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Virtualmente no tóxico para abejas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas. No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.
Prácticamente no tóxico para aves. Evitar la presencia de estas en el área de aplicación e impedir que tomen contacto con el producto.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EPYCO SIGMA	SIGMA AGRO SA	41802	SE	13,3% + 5%	II
OPERA	BASF ARGENTINA	33932	SE	13,3% + 5%	II
PLADOX	BASF ARGENTINA	36950	SE	13,3% + 5%	II
RENASTE	BASF ARGENTINA	36949	SE	13,3% + 5%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.