QUIZALOFOP P ETIL

Nomenclatura Química:
quizalofo p-etil: etil éster del ácido (R)-2-[4-[(6-cloro-2-quinoxalinil)-oxi]-fenoxi]-propionato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja .	Pappophorum (*Pappophorum spp.)*	PC 10,8%: 1,2 l/ha (*)		Aplicar sobre plantas en activo crecimiento, con no más de tres macollos, y menos de un año de edad. La eficacia de control disminuye significativamente sobre plantas que han emergido durante la ciclo de emergencia del año anterior.
Alfalfa Girasol Maní Soja	Capín (*Echinochloa spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	PC 1,8%: 1,5 - 2,0 l/ha PC 10,8%: 0,4-0,5 l/ha (*)	30	Plantas con 1-3 hojas verdaderas hasta 3 macollos.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	PC 1,8%: 3,0 a 3,5 l/ha		Antes de la floración, con la maleza en activo crecimiento y estolones de 10 a 15 cm.
	Maíz guacho resistente a glifosato (*Zea mays)*	PC 1,8%: 1,5 - 1,75 l/ha PC 10,8%: 0,35 - 0,5 l/ha (*)		Utilizar la dosis menor en plantas de maíz menores a 4 hojas y la dosis mayor en plantas de maíz con 6 a 8 hojas.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	PC 1,8%: 1.5 - 2,0 l/ha		Cuando la mayor parte del sorgo haya emergido, se encuentre en activo crecimiento y su altura sea de 10 a 15 cm.
		PC 10,8%: 0,4 - 0,5 l/ha (*)		Cuando la mayor parte del sorgo haya emergido, se encuentre en activo crecimiento y su altura sea de 25 a 40 cm.
Poroto (negro y blanco)	Capín (*Echinochloa spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	PC 1,8%: 1,5 - 2,0 l/ha	60	Plantas con 1-3 hojas verdaderas hasta 3 macollos.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	PC 1,8%: 3,0 - 3,5 l/ha		Antes de la floración, con la maleza en activo crecimiento y estolones de 10 a 15 cm.
	Maíz guacho resistente a glifosato (*Zea mays)*	PC 1,8%: 1,5 - 1,75 l/ha		Utilizar la dosis menor en plantas de maíz menores a 4 hojas y la dosis mayor en plantas de maíz con 6 a 8 hojas.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	PC 1,8%: 1.5 - 2,0 l/ha		Cuando la mayor parte del sorgo haya emergido, se encuentre en activo crecimiento y su altura sea de 10 a 15 cm.
Algodón	Capín (*Echinochloa spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	PC 1,8%: 1,5 - 2,0 l/ha PC 10,8%: 0,4-0,5 l/ha (*)	NC	Plantas con 1-3 hojas verdaderas hasta 3 macollos.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	PC 1,8%: 3,0 a 3,5 l/ha		Antes de la floración, con la maleza en activo crecimiento y estolones de 10 a 15 cm.
	Maíz guacho resistente a glifosato (*Zea mays)*	PC 1,8%: 1,5 - 1,75 l/ha PC 10,8%: 0,35 - 0,5 l/ha (*)		Utilizar la dosis menor en plantas de maíz menores a 4 hojas y la dosis mayor en plantas de maíz con 6 a 8 hojas.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	PC 1,8%: 1.5 - 2,0 l/ha		Cuando la mayor parte del sorgo haya emergido, se encuentre en activo crecimiento y su altura sea de 10 a 15 cm.
		PC 10,8%: 0,4 - 0,5 l/ha (*)		Cuando la mayor parte del sorgo haya emergido, se encuentre en activo crecimiento y su altura sea de 25 a 40 cm.

(*) Agregar aceite mineral refinado (85% mínimo), de uso agrícola a razón de 1 - 1,5% al caldo de aplicación.

Nota: usar las dosis mayores cuando el estado vegetativo de las malezas sea óptimo y las condiciones ambientales sean favorables (humedad del suelo, temperatura del aire y humedad relativa).
Para lograr máxima eficacia de quizalofop p-etil en el control de gramón y sorgo de Alepo es necesario hacer un buen trozado de los rizomas al preparar el lote a sembrar. Los rizomas cortos brotarán de manera más uniforme y facilitarán la translocación y acción del herbicida.
Para el control de sorgo de Alepo se debe realizar un muy buen mojado y prestar especial atención al tamaño de la maleza (25 - 40 cm de altura, máximo) y condiciones ambientales al momento de la aplicación (ausencia de stress hídrico, con plantas en activo crecimiento).

Información General:

Quizalofop p-etil es un herbicida de uso exclusivamente agrícola, indicado párale control selectivo de gramón y sorgo de Alepo en los cultivos de algodón, soja, girasol, maní, alfalfa y porotos.

Quizalofop p-etil es un herbicida sistémico, rápidamente absorbido y translocado hacia el sistema radicular y puntos de crecimiento de las plantas susceptibles cuando es pulverizado sobre su follaje.
La sintomatología de las afectadas está dada por la aparición de una clorosis progresiva y manchas rojizas o violáceas, que lentamente se van tornando marrones a medida que se produce la muerte de los tejidos. Si las condiciones de humedad han sido óptimas, la muerte de la planta ocurre a las dos o tres semanas de la aplicación. Si se traccionan las plantas que manifiestan los síntomas arriba descriptos, parte de ellas se desprende mostrando una coloración marrón característica y necrosis de la zona de ruptura.
Quizalofop p-etil puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre convencional provisto de picos con pastillas de abanico plano o de cono hueco, para lograr un buen tamaño de gota. El caudal deberá ser de 100 a 200 litros/ha según el tamaño y densidad de las malezas y del cultivo, para asegurar un eficiente mojado. La presión de trabajo deberá ser de 60 a 80 lb/pulg2 (4,2 a 5,5 bar). Para un resultado eficaz se recomiendo alcanzar 20 - 30 gotas/cm2. Verificar el correcto funcionamiento del equipo previamente a la aplicación, y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Quizalofop p-etil también puede ser aplicado con avión, utilizando 15 a 20 litros de agua por hectárea.
La deriva de la pulverización puede afectar cultivos susceptibles vecinos como trigo, cebada, avena, sorgo, arroz y maíz.
Evitar la deriva de la pulverización. Esta puede minimizarse o evitarse no aplicando con vientos superiores a 8 - 10 km/h o menores a 3 km/h (por riesgo de inversión térmica), disminuir la altura de la barra de aplicación (mínima altura que permita lograr una pulverización homogénea, y pulverizar gotas de gran diámetro (aproximadamente 200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

No aplicar quizalofop p-etil cuando las malezas estén bajo situación de estrés hídrico porque el control puede ser deficiente, ya que las mismas son menos susceptibles a la acción del herbicida.
No aplicar quizalofop p-etil si se esperan lluvias dentro de 3 horas luego de la aplicación, ya que pueden afectar el control.
No usar producto preparado el día anterior.
La aplicación de herbicidas post-emergentes para el control de malezas de hoja ancha dentro de los 3 días previos a la aplicación de quizalofop p-etil, puede resultar en una reducción de la efectividad de éste.

Derrames:
Mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y absorber el derrame con un material inerte (aserrín, arena, tierra), recogerlo con pala junto con la capa superficial de suelo afectada y colocarlos en un recipiente; cubrir con solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua). El producto debe ser enviado a un establecimiento adecuado para su debido tratamiento.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del Equipo y aplicación: protector facial, guantes y botas de goma de nitrilo, camisa mangas largas, pantalones largos y delantal resistente.
Aplicación: protector facial, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos

Información Toxicológica:

Del formulado al 1,8%	
Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5 mg/l
Del formulado al 10,8%	
Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 2777 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5 mg/l
Irritación dermal:	Severo irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No existe antídoto específico; aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional. Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.