QUIZALOFOP P TEFURIL

Marcas comerciales: PANTERA - PANTERA 12% - RANGO GR.

Nomenclatura Química:
quizalofop p-tefuril: Ester (RS)-2-tetrahidrofuranil metil del acido (R) -2-[4-[(6-cloro-2-quinoxalinil) oxi] fenoxi] propanoico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón Girasol Maní Papa Poroto Soja	Capín (*Echinochloa spp.)* Pie de gallina (*Eleusine indica)*	PC 12%: 0,6 - 1,0 l/ha PC 3%: 2,0 - 4,0 l/ha	30	Malezas de 3 - 4 hojas verdaderas hasta 3 macollos.
	Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	PC 12%: 0,8 - 1,2 l/ha PC 3%: 3,2 - 4,8 l/ha		Cuando el gramón tenga estolones de 5 a 10 cm hasta 15 cm.
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	PC 12%: 0,8 - 1,0 l/ha PC 3%: 3,2 - 4,0 l/ha		Malezas de 3 - 4 hojas verdaderas hasta 3 macollos.
	Sorgo de Alepo de rizoma o semilla (*Sorghum halepense)*	PC 12%: 0,6 - 1,0 l/ha PC 3%: 2,4 - 4,0 l/ha		Cuando las plantas de sorgo de Alepo tengan de 4 a 6 hojas hasta el estado de hoja bandera. Dosis recomendada para sorgo de Alepo de rizoma o semilla biotipo resistente a glifosato.
Soja .	Maíz guacho resistente a glifosato (*Zea mays)*	PC 12%: 0,3 - 0,4 l/ha PC 3%: 1,2 - 1,6 l/ha (*)		Plantas de hasta 50 cm de altura.

(*) Se aconseja el uso de la dosis mayor en el caso de que el estado de desarrollo del maíz guacho sea de 6 hojas.

Información General:

Herbicida graminicida selectivo y sistémico, con una formulación al 12%, y una formulación preparada con aceite al 3%.

Equipos y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con equipos terrestres, aéreos y con equipos de mochila para tratamientos de manchoneo. En todos los casos se debe asegurar una cobertura mínima de 20 - 30 gotas / cm2. Evitar la aplicación con vientos superiores a los 10 km. por hora.
Siempre deberá asegurarse previamente que el tanque del equipo aplicador se encuentre limpio y libre de restos de productos de pulverizaciones anteriores.
Equipos terrestres: El volumen deberá estar entre 100-150 l/ha. Emplear pastillas tipo abanico plano (N68002 o 11002). Presión 35-45 libras por pulgada cuadrada.
Equipos aéreos: El volumen mínimo por hectárea será de 20 litros (agua+ Producto 12% + aceite de uso agrícola, mineral o vegetal, de alto contenido de emulsionantes balanceados en su formulación (como mínimo 15% p/p). Como es fundamental asegurar un buen mojado de las plantas (correcta cobertura de la maleza) conviene adoptar el mínimo ancho de trabajo que permitan las condiciones climáticas en el momento de la aplicación.
Equipos de mochila: Aplicar una solución al 0,5% del herbicida más 0,5% de aceite de uso agrícola, mineral o vegetal, de alto contenido de emulsionantes balanceados en su formulación (como mínimo 15% p/p).

Es fundamental asegurar un buen mojado de las plantas, conviene adoptar el mínimo ancho de trabajo que permitan las condiciones climáticas en el momento de aplicación.
Aplicar cuando existan buenas condiciones de humedad en el suelo y las malezas estén en activo crecimiento. Es conveniente no escardillar el cultivo antes de la aplicación. Es necesario escardillar entre los 5 a 7 días después de la aplicación para lograr un óptimo control de las malezas. Evitar la aplicación con vientos superiores a 10 km. Evitar la aplicación con rocío.
NO aplicar en condiciones de sequía.

Modo de acción: una vez que penetró en la planta se traslada rápidamente a los tejidos de activo crecimiento (meristemas), inhibiendo la formación de lípidos de la membrana celular.
La planta detiene su crecimiento y luego de visualizarse los síntomas, muere.

Compatibilidad: debe ser aplicado en mezclas con herbicidas hormonales (2.4 D Amina, 2.4 D Ester, dicamba, M.C.P.A, etc.) ya que por tener un mecanismo de acción similar, compiten en el sitio de acción dentro de la planta, ocasionando una incompatibilidad química entre ambos principios activos. No se recomienda mezclar con productos de reacción alcalina. Puede ser utilizado en mezcla con insecticidas como deltametrina y con herbicidas a base de glifosato. Antes de realizar mezclas con otros agroquímicos de uso corriente se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en pequeña escala según recomendación de un Ingeniero Agrónomo.

FITOXICIDAD: A las dosis recomendadas, para los cultivos registrados y de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas, no se han observado síntomas de fitotoxicidad.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 3%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 6,8 mg/l

Irritación dermal: Moderado Irritante dermal. Categoría III: Evitar contacto con piel y ropa (CUIDADO)
Irritación ocular: Moderado Irritante ocular. Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos (CUIDADO)
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Del producto formulado al 12%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 3100 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 4,8 mg/l

Irritación dermal: Moderado Irritante dermal. Categoría III: Evitar contacto con piel y ropa (CUIDADO)
Irritación ocular: Moderado Irritante ocular. Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos (CUIDADO)
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Advertencia para el médico: aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PANTERA	UPL ARGENTINA S.A.	31948	EC	3%	III
PANTERA 12%	UPL ARGENTINA S.A.	34396	EC	12%	III
RANGO GR	UPL ARGENTINA S.A.	31890	EC	12%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.