SETOXIDIM

Nomenclatura Química:
setoxidim: [2-(1-(etoxiimino)butil)-5-(2(etiltio)propil)-3-hidroxi-2-ciclohexan-1-ona].
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dionaoxima.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (postemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Acelga Ajo Alfalfa Algodón Apio Arándano Arveja o alverja Batata o boniato Berenjena Brócoli Cebolla Chaucha Cítricos o citrus Col Coliflor Espárrago Espinaca Florales Forestales Frambuesa Frutales de carozo Frutales de pepita Frutilla Girasol Lechuga Lenteja Lino (Semilla) Maní Melón Menta Nogal Olivo Ornamentales Papa Pimiento Poroto Remolacha Repollito de Bruselas Sandía Soja Tabaco Tomate Vid Zanahoria Zapallo criollo Zapallo de angola Zarzamora	Avena guacha (*Avena fatua*) Cadillo (*Cenchrus echinatus*) Capín (*Echinochloa crus-galli*) Colas de zorro (*Setaria viridis*) Pasto bandera (*Brachiaria extensa*) Pasto colorado (*Echinochloa colonum*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)	1,5 - 2 l/ha	(*)	Excelente humedad del suelo: 1) 2 - 4 hojas de la maleza: 1,5 l/ha. 2) 2 - 3 macollos de la maleza: 2 l/ha. Buena humedad del suelo: 2 - 4 hojas: 2 l/ha.
	Falso pasto tul (*Eragrostis virescens*) Pasto crespo (*Diplachne uninervia*) Pata de ganso (*Eleusine indica*)	2 - 2,5 l/ha		Excelente humedad del suelo: 1) 2 - 4 hojas de la maleza: 2 l/ha. 2) 2 - 3 macollos de la maleza: 2,5 l/ha. Buena humedad del suelo: 2 - 4 hojas: 2,5 l/ha.
	Gramón (*Cynodon dactylon*)	4,5 - 5,5 l/ha		Excelente humedad del suelo: 5 - 10 cm de largo de guía; dosis 4,5 l/ha. Buena humedad del suelo: con 5 - 10 cm de largo de guía: dosis 5,5 l/ha
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense*)	1,5 - 3,5 l/ha		Sorgo de Alepo de semilla: Excelente humedad del suelo: 10 - 15 cm de altura de la maleza; dosis 1,5 l/ha. Buena humedad del suelo: 10 - 15 cm de altura; dosis 2 l/ha. Sorgo de Alepo de rizoma: Excelente humedad del suelo: 15 - 20 cm de altura; dosis 3 l/ha. Buena humedad del suelo: 15 - 20 cm de altura; dosis 3,5 l/ha. El producto también se puede aplicar en forma dividida: Excelente humedad del suelo: 1- aplicación a los 15 - 30 cm de altura de la maleza con una dosis de 1,8 l/ha; 2- con rebrotes de 10 - 15 cm de altura aplicando 1,5 l/ha. Buena humedad del suelo: 1-aplicación con 15 - 30 cm de altura de la maleza aplicar una dosis de 2 l/ha; 2- con rebrotes de 10 - 15 cm de altura aplicando 1,8 l/ha.

(*) TC 7: col, espárrago, frambueso y zarzamora.
TC 14: melón, sandía, zapallo criollo y zapallo de angola.
TC 15: berenjena, espinaca, frutilla, pimiento y tomate.
TC 30: acelga, ajo, alfalfa, apio, arándano, batata, brócoli, cebolla, coliflor, lechuga, menta, remolacha, repollito de Bruselas y zanahoria.
TC 60: algodón, arveja, citrus, frutales de carozo y de pepita, lenteja, lino (semilla), maní, olivo, papa, poroto, soja, tabaco y vid.
TC 90: girasol.
TC SR: florales, forestales y ornamentales.

Información General:

Herbicida post-emergente sistémico para el control selectivo de malezas gramíneas anuales y perennes. El producto puede aplicarse en cultivos de maíz que tengan el gen de resistencia a sethoxydim (Híbridos: DK 592, AX699 P). No controla malezas de hoja ancha ni ciperáceas. Es absorbido rápidamente por las hojas de las malezas; actúa bloqueando la respiración y el crecimiento al nivel de la yema apical. El producto detiene el crecimiento inmediatamente después de ser aplicado, eliminando la competencia del cultivo.
Es selectivo en cultivos de dicotiledóneas y de ciertas monocotiledóneas como las liliáceas. No tiene efecto residual en el suelo, de ahí que deba ser asperjado después que todas las gramíneas hayan emergido.
No aplicar en caso de falta de humedad. Aplicar con caudales de 150 - 200 l/ha de agua. Debe agregarse a todos los tratamientos un aceite mineral no fitotóxico a razón de 2 l/ha.
Es importante escardillar 4 - 5 días posteriores a la aplicación.
Lluvias posteriores a 3 horas de la aplicación no afectan la actividad del producto.
Se puede aplicar con equipos terrestres de botalón, gota controlada y mochila con una presión de trabajo de 80 - 150 lb/pulg2.
En aplicaciones aéreas el caudal debe ser de 15 - 20 l/ha, recomendando no aplicar en días de viento pues la deriva puede afectar a cultivos vecinos a base de gramíneas.

Horario de la aplicación: la máxima eficacia se obtiene en horas de la tarde hasta la noche, cuando comienza la caída del rocío.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.

Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la aplicación y preparación: Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial y guantes impermeables.

Información Toxicológica:

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 3047 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 3,5 mg/l
Irritación dermal:	Irritante
Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales: Prácticamente no tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional. Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.