SIMAZINA

Nomenclatura Química:
simazina: 2-cloro-4,6-bis(etilamina) -1,3,5 -triazina
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Alfilerillo (*Erodium cicutarium)* Bolsa del pastor, Zurrón del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Lupulina (*Medicago lupulina)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga (*Urtica urens)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Revienta caballo (*Solanum elaeagnifolium)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	Según suelo.		Dosis según suelo: Suelo liviano: 3,2 l/ha. Suelo pesado: 4,0 l/ha. Realizar tratamiento de post-emergencia en alfalfares implantados de más de un año. La aplicación debe hacerse después de un corte o pastoreo intenso y en momento de receso de la vegetación (invierno).
Caña de azúcar				Dosis según suelo: Suelo liviano: - Tratamiento total: 6,0 l/ha. - Tratamiento en bandas de 70 cm de ancho por cada surco de 100 m de largo: 40 cm3. Suelo pesado: - Tratamiento total: 8,0 l/ha. - Tratamiento en bandas de 70 cm de ancho por cada surco de 100 m de largo: 56 cm3.
Maíz				Dosis según suelo: Suelo liviano: - Tratamiento total: 4,0 l/ha. - Tratamiento en banda de 30 cm; 1,6 l/ha. Suelo pesado: - Tratamiento total: 6,0 l/ha. - Tratamiento en banda de 30 cm; 2,4 l/ha.

Información General:

Herbicida selectivo que controla gramíneas y latifoliadas, puede persistir varios meses en el suelo. Es absorbido exclusivamente por raíces.
Está indicado para zonas de riego o con lluvias regulares.
Cuando el riego se hace por aspersión, aplicar antes. Cuando el mismo se hace por inundación, aplicar después.
En suelos tratados, no plantar o sembrar cultivos susceptibles (cereales de invierno, hortalizas, espárragos, maní, papa, alfalfa) en la misma estación en que se ha hecho el tratamiento, dejar transcurrir de 4 a 6 meses.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

Verifique con la empresa registrante los datos toxicológicos de este producto

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

En todos los usos y situaciones debe evitarse la contaminación de los cuerpos de agua por aplicación directa sobre los mismos o contaminación por deriva.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.