Versión Digital de la Guía de Productos Fitosanitarios - CASAFE - Edición 2015/2017
Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

SULFATO DE ESTREPTOMICINA

Nomenclatura Química:
sulfato de estreptomicina o 0-2-deoxi-2-metilamino-alfa-L-glucopiranosil-(l-2)-0-5-deoxi-3-C-formil-alfa-L-lixofuranosil-(1-4)-N,N-diamidino-D-estreptamina.

Clasificación Química: antibiótico.
Acción: sistémica.

Uso: bactericida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arveja o alverja	Tizón bacteriano de la arveja (*Pseudomonas syringae pv. pisi)*	PC 77%: 2g/10 litros de agua.		Tratamiento de semillas: mantenerlas sumergidas durante 3 - 4 minutos. Luego secar.
		PC 77%: 2g/2 litros de agua.		Tratamiento de semillas en tambor mezclador: utilizar cada 50 kg de semilla l/4 l de la solución. Luego secar.
		PC 77%: 30 g/hl		En cultivo: pulverizar al iniciarse la floración del cultivo.
Calas	Podredumbre de los rizomas (*Erwinia carotovora var. aroideae)*	PC 77%: 40 g/hl		Tratamiento de rizomas: antes de plantarlos, sumergir los rizomas por espacio de 8 a 10 horas. En cultivo: pulverizar a los 15 días de plantado. La misma solución puede utilizarse en cultivos implantados, cuando el ataque no es intenso.
Ciruelo Duraznero	Cancrosis del ciruelo (*Xanthomonas campestris pv. pruni)*	PC 77%: 60 g/hl	(*)	Pulverizar cuando las yemas estén hinchadas, antes de iniciarse la brotación. Mojar abundantemente.
Cítricos o citrus	Cancrosis de los citrus (*Xanthomonas campestris pv. citri)*	PC 77%: 200 g/hl	3	Pulverizar ante los primeros síntomas. Conviene repetir a los 15 días. Se puede aplicar también con el agregado de 350 g de oxicloruro de cobre en igual volumen de agua.
Clavel	Marchitez bacteriana del clavel (*Pseudomonas caryophylli)*	PC 77%: 2 g/15 litros de agua (1) PC 77%: 30 g/hl (2)		(1): tratamiento de gajos; sumergirlos durante 6 horas. (2): en cultivo; pulverizar a los 15 - 20 días de trasplantados. Repetir el tratamiento cada 30 días.
Florales Frutales Ornamentales	Agalla de corona (*Agrobacterium tumefaciens)*	PC 77%: 20 g/hl (2) PC 77%: 2g/10 litros de agua (1)		(1): tratamiento para estacas; sumergir en la solución durante 6 horas. (2): tratamiento en injertos; luego de haber prendido, pulverizarlos con esta solución.
Gladiolo	Podredumbre del gladiolo (*Pseudomonas gladioli)*	PC 77%: 20 g/hl (1) PC 77%: 30 g/hl (2)		(1): tratamiento de bulbos; sumergirlos durante varios minutos. Luego dejar secar. (2): en cultivo; pulverizar ante los primeros síntomas de la enfermedad.
Lechuga	Bacteriosis de la lechuga (*Pseudomonas marginalis pv. marginalis)*	PC 77%: 2g/6 litros de agua (1) PC 77%: 40 g/hl (2)		(1): tratamiento de semillas; sumergirlas durante 30 minutos, una vez secas se pueden sembrar. (2): en cultivo; pulverizar a los 30 días de la germinación, a razón de 200 l/ha.
Nogal	Tizón bacteriano del nogal (*Xanthomonas campestris pv. juglandis)*	PC 77%: 130 g/hl	3	Pulverizar luego de la floración. Si el ataque es intenso realizar dos aplicaciones, una antes y otra después de la floración.
Papa	Podredumbre blanda de las hortalizas (*Erwinia carotovora p.v. carotovora)*	PC 77%: 40 g/hl		Tratamiento de tubérculos: mantenerlos sumergidos durante varios minutos.
Pepino	Mancha angular de las curcurbitáceas (*Pseudomonas syringae pv. lachrymans)*	PC 77%: 4 g/10 litros de agua (1) PC 77%: 40 g/hl (2)	3	(1): Tratamiento de semillas; sumergirlas por espacio de 6 a 8 horas. Luego secar. (2): En cultivo; tratar los primeros síntomas de la enfermedad.
Pimiento	Mancha bacteriana del tomate (*Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)* Podredumbre blanda de las hortalizas (*Erwinia carotovora p.v. carotovora)*	PC 77%: 2 g/5 litros de agua (1) PC 77%: 4 g/10 litros de agua (2) PC 77%: 40 g/hl (3)		(1): Tratamiento de semillas; sumergirlas de 6 a 8 horas. Una vez secas están listas para sembrar. (2): En almácigos; pulverizar cuando están formadas las hojas definitivas. (3): En cultivo; al aparecer los primeros frutos.
Poroto	Mancha grasienta del poroto (*Xanthomonas campestris pv. phaseoli)*	PC 77%: 4g/10 litros de agua.		Tratamiento de semillas: sumergirlas en la solución por espacio de 10 - 15 minutos.
	Mancha grasienta del poroto (*Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)*	PC 77%: 6 g/10 litros de agua.		Tratamiento de semillas: en tambor mezclador a razón de 200 ml de esta solución por cada 100 kg de semilla.
Repollo	Podredumbre blanda de las hortalizas (*Erwinia carotovora p.v.*	PC 77%: 40 g/hl		En cultivo: pulverizar ante los primeros síntomas de la enfermedad.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

	carotovora)			
Rosales	Agalla de corona (*Agrobacterium tumefaciens)*	PC 77%: 30 g/hl		1- En el vivero al observarse en las plantas a pie desnudo la presencia de agallas, se deben eliminar. Sumerja luego las plantas hasta el cuello en la solución indicada por espacio de 6 - 7 horas. 2- En cultivo: en ataque leve la planta se recupera rápidamente luego de la primera pulverización. Frente a ataques graves se debe repetir el tratamiento cada 30 días.
Tabaco	Moho azul del tabaco (*Peronospora tabacina)* Quemazón del tabaco (*Pseudomonas syringae pv. tabaci)*	PC 77%: 2 g/10 litros de agua (1) PC 77%: 4 g/10 litros de agua (2)		(1): en almácigo, tratamiento preventivo: una vez formadas las hojas definitivas pulverizar mojando abundantemente. Se aconseja repetir el tratamiento 2 días antes de realizar el trasplante. (2): en almácigos, tratamiento curativo; pulverizar las plantitas abundantemente.
Tomate	Cancro bacteriano del tomate (*Clavibacter michiganense)* Mancha bacteriana del tomate (*Xanthomonas campestris pv. vesicatoria)*	PC 77%: 2 g/5 litros de agua (1) PC 77%: 4 g/10 litros de agua (2) PC 77%: 40 g/hl (3)	7	(1): tratamiento de semillas; sumergirlas 6 a 8 horas. Una vez secas están listas para sembrar. (2): en almácigos; pulverizar cuando están formadas las hojas definitivas. Se aconseja repetir el tratamiento dos días antes de realizar el trasplante. (3): en cultivo: pulverizar luego de cada desbrote. Repetir a los 30 días.
Zanahoria	Podredumbre blanda de las hortalizas (*Erwinia carotovora p.v. carotovora)* Tizón bacteriano de la zanahoria (*Xanthomonas campestris pv. carotae)*	PC 77%: 3 g/10 litros de agua (1) PC 77%: 30 g/hl (2)		(1): tratamiento de semillas: sumergirlas durante 1 hora en dicha solución. (2): en cultivo; pulverizar a los 30 días de haber germinado, a razón de 200 l/ha. Tratamiento curativo: pulverizar con la misma dosis ante la aparición de los primeros síntomas. Post cosecha: si existen síntomas de ataque luego de cosechar, después del lavado sumergir durante varios minutos en la solución indicada.

(*) Para ciruelo TC: 3. Para duraznero TC: 7

Información General:

Es un antibiótico bactericida y fungicida de acción sistémica, que controla enfermedades fitopatógenas provocadas por bacterias Gram negativas y ciertos hongos.

Propiedades físicas y químicas del principio activo: polvo gris pálido.
La estreptomicina se obtuvo por fermentación del Streptomyces griseus.
Solubilidad: 20 g/l de agua, 35 mg/l de tetracloruro de carbono, 300 mg/l de etanol, 850 mg/l de metanol. Estable a la luz, se descompone en presencia de ácidos concentrados o álcalis.
Es soluble en agua. No altera su estabilidad siempre que se lo conserve en el envase, bien cerrado, a temperaturas no mayores a los 22 ºC y protegido de la luz solar directa.

Modo de Acción: es absorbido por las hojas y partes verdes de la planta, se incorpora a la savia, trasladándose a todos los tejidos internos.
Actúa frente al patógeno deteniendo el avance de la enfermedad y evitando la propagación a las partes no atacadas del vegetal. A su vez evita que se produzcan nuevas infecciones provenientes del medio donde se desarrolla la planta.

Compatibilidad: no presenta problemas con la mayoría de los insecticidas y fungicidas.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico a la dosis recomendada.

Aplicación: se lo aplica utilizando cualquier equipo pulverizador. En todos los casos se recomienda mojar abundantemente el follaje para que el producto pueda ser absorbido correctamente.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 25 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Toxicidad oral aguda (ratón):	DL50: 9.000 mg/kg

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

Toxicidad para el hombre:	No tóxico
Toxicidad para animales domésticos:	No tóxico

Puede causar reacción alérgica cutánea.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.