Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

SULFATO DE ZINC



Nomenclatura Química:
Sulfato de zinc.
Clasificación Química: compuesto quelatado.
Acción: aporte de zinc.

Uso: fertilizante (foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla	0,5 - 0,7 kg/ha por aplicación.	Dos a cuatro aplicaciones. La primera con 5 - 10 cm de altura. La segunda con 15 - 20 cm de altura durante el desarrollo del bulbo. Concentración máxima: 0,2 %. En almácigos o viveros (aplicaciones semanales) la concentración máxima será de 0,05%.
Algodón	0,7 - 1 kg/ha por aplicación.	Dos a cuatro aplicaciones. La primera a la formación de los brotes. Las siguientes con intervalos de 15 días. Concentración máxima: 0,3%.
Banano o plátano	0,5 - 1,5 kg/ha por aplicación.	Cinco a ocho aplicaciones. Aplicaciones mensuales. Concentración máxima: 0,2%.
Café	0,5 - 1 kg/ha por aplicación.	Dos a tres aplicaciones. La primera posteriormente a plena floración. La segunda a rebrote de hojas. La tercera 30 - 40 días después. Concentración máxima: 0,2%. En almácigos y/o viveros (aplicaciones semanales) concentración máxima: 0,05%.
Cereales		Dos a cuatro aplicaciones. La primera a comienzo del macollaje. Repetir si es necesario cada 10 o 15 días. Concentración máxima: 0,3%.
Ciruelo Duraznero Pelón	0,5 - 0,7 kg/ha por aplicación.	Dos aplicaciones. La primera antes de la floración y la segunda a la caída de los pétalos. Concentración máxima: 0,1%.
Cítricos o citrus	0,5 - 1,5 kg/ha por aplicación.	Tres a cuatro aplicaciones por período vegetativo. Comenzar al inicio de la brotación en primavera. Repetir tres semanas después. Hacer otra aplicación al inicio de la brotación de otoño. Concentración máxima: 0,2%.
Hortalizas	0,5 - 1 kg/ha por aplicación.	Tres a cinco aplicaciones. La primera 20 - 30 días después del trasplante o emergencia. El resto distribuidas a lo largo del ciclo vegetativo. Concentración máxima: 0,2%. En aplicaciones en almácigos y/o viveros (aplicaciones semanales): concentración máxima; 0,05%.
Maní Poroto Soja		Una a tres aplicaciones. La primera a la formación de los brotes. La segunda a inicio de la floración. La tercera 15 días después. Concentración máxima: 0,2%.
Manzano Peral	0,5 - 1,5 kg/ha por aplicación.	Dos a tres aplicaciones. La primera a botón rosado. La segunda a caída de pétalos. La tercera 20 días después. Concentración máxima: 0,1%.
Tabaco	0,3 - 0,7 kg/ha por aplicación.	Dos a tres aplicaciones. La 20 días después del trasplante. Repetir si es necesario cada 10 a 15 días. Concentración máxima: 0,05%.
Té	0,5 - 1 kg/ha por aplicación.	Dos a tres aplicaciones. La primera al inicio de la época lluviosa. La segunda luego del primer corte. La tercera 30 días después. Concentración máxima: 0,2%. En almácigos y/o viveros (aplicaciones semanales) concentración máxima; 0,05%.
Vid	0,5 - 1,5 kg/ha por aplicación.	Dos a tres aplicaciones. La primera con brotes de 20 - 30 cm de largo ó 4 - 6 hojas. La segunda antes de la floración. La tercera 14 días después. Concentración máxima: 0,1%.

Información General:

Es un fertilizante a base de zinc altamente concentrado en forma quelatizada de Zn-EDTA o Zn-DTPA o en complejantes como flavonoides, lignosulfonatos, etc.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Se trata de una sal blanquecina, soluble en agua aplicado a las concentraciones aconsejadas. La riqueza en Zn depende del contenido de agua de cristalización. Se disuelve hasta una concentración máxima, referida a ZnSO4, de 35%.

Aplicación:
- En casos de deficiencias agudas con síntomas visibles, realizar aplicaciones repetidas con las dosis más elevadas en intervalos de 2 - 4 semanas.
- Como tratamiento preventivo de cultivos intensivos son suficientes aplicaciones repetidas con las dosis más bajas.
- Fertirrigación: puede ser aplicado mediante riego por goteo: 300 - 500 g de producto en 1000 litros de agua cada 10 días.
- Aplicaciones frecuentes de dosis menores incrementan la efectividad.
- No se recomienda en aplicaciones foliares debido a que es algo ácido (se recomienda aplicar el sulfato básico de Zn, los quelatos o los complejos).

Compatibilidad:
- Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, sin embargo se aconseja realizar previamente un ensayo de compatibilidad en pequeña escala con los productos a aplicar.
- No debe mezclarse con otros fertilizantes foliares.
- Este producto es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común al suelo.

Almacenamiento:
No dejar los envases abiertos pues este producto se humedece en contacto con el aire.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.