TEBUTIURON

Nomenclatura Química:
tebutiuron: N [5 (1.1-dimetil etil)-1,3,4-tiadiazol-2-il] N, N dimetilurea.
Clasificación Química: urea.
Acción: residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Brachiaria plantaginea (*Brachiaria plantaginea)* Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Camalote (*Panicum elephantipes)* Caminadora, Pica pica (*Rottboellia exaltata)* Capín (*Echinochloa spp.)* Granadillo (*Panicum fasciculatum)* Leche-leche (*Euphorbia maculata)* Lecherón (*Euphorbia heterophylla)* Paitén (*Cenchrus parviflorus)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto guinea (*Panicum maximum)* Pasto horqueta (*Paspalum notatum)* Pasto morado (*Leptochloa filiformis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Verdolaga rastrera (*Portulacastrum monogynum)*	1,5 - 2 l/ha	125	En el primer año de aplicación: sea caña planta o caña soca cuando el cultivo tenga 2 - 4 hojas hasta 1 macollo. Aplicar antes de la emergencia de las malezas y después del "tapado" del cultivo; siempre antes de que la caña de azúcar por su desarrollo pueda interferir sobre la distribución uniforme del herbicida en el suelo. Las dosis mínimas se aplican en suelos livianos y las máximas en suelos pesados.
Caña de azúcar (soca)		1 - 1,5 l/ha		A partir del segundo año de aplicación puede aplicarse en cualquier época del año, en pre emergencia de las malezas. En suelos livianos, aplicar las dosis máximas.

Información General:

Herbicida selectivo para el cultivo de caña de azúcar, controla malezas anuales, gramíneas y latifoliadas. Al ser aplicado se ubica en la superficie del suelo (bien trabajado, sin terrones), no es volátil. Penetra por la raíz al producirse la emergencia de las malezas.

Modo de acción: se moviliza por xilema y actúa sobre la fotosíntesis provocando la muerte de la maleza.
Puede ser aplicado en cualquier época del año, en suelo húmedo actúa rápidamente. En suelo seco actuará a partir de una lluvia.
El laboreo superficial del suelo luego de una lluvia no afecta su actividad herbicida. Esta persiste de 90 a 250 días desde la aplicación.
Es muy estable expuesto a la luz solar.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los herbicidas utilizados en la caña de azúcar. Se recomienda hacer una mezcla previa de compatibilidad física, o consultar a la empresa.

Equipos de aplicación: utilizar equipos terrestres de barra provistos de pastillas tipo abanico plano. Emplear volumen de agua de 100 - 200 l/ha y una presión de 25 - 35 lb/pulg2.
Con mochila utilizar volúmenes de agua de 150 - 250 l/ha, pastillas tipo abanico plano y 25 - 30 lb/pulg2 de presión.
En aplicaciones aéreas el volumen de agua será de 30 - 50 l/ha. Presión 25 - 40 lb/pulg2.

Riego: en plantaciones de invierno/primavera, en zonas que presenten un balance hídrico del suelo negativo (zonas con regímenes pluviales inferiores a 800 mm anuales), se recomienda regar dentro de los 10 días posteriores a la aplicación.

Abonado: se puede hacer posterior a la aplicación sin incorporación, o bien hacerla superficialmente.

Restricción de uso: suspender su aplicación, 24 meses antes de hacer rotación con cultivos susceptibles: soja, maní, poroto, cártamo, trigo, maíz.

Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente(Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): C2(HRAC) o 7(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
DL 50 oral aguda para ratas macho: 477,5 mg/kg.
DL 50 oral aguda para ratas hembra: 387,5 mg/kg.
DL 50 dermal aguda para conejos > 5000 mg/kg.

Del producto formulado al 50%:
DL 50 oral aguda en rata 1464 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata > 2000 mg/kg.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

En caso de ingestión accidental: inducir el vómito. Llamar de inmediato a un médico.
Antídoto: no posee.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.