TERBACIL

Nomenclatura Química:
terbacil: 3-terbutil-5-cloro-6-metiluracilo.
Clasificación Química: uracilo.
Acción: residual.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	Amor seco (*Bidens pilosa)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Gramilla de huerta (*Eragrostis mexicana sub virescens)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	Aplicaciones de otoño y primavera: 0,65 a 1 kg/ha (**)		Aplicar en otoño inmediatamente luego de la plantación y antes de la aparición de las malezas y la caña. Repetir la aplicación a principios de primavera siguiendo al descostillado, luego de haber removido la tierra y antes de la aparición de las malezas. (**) 2 aplicaciones.
	Aplicaciones de primavera: 1,5 a 2 kg/ha (*)		Aplicar a principios de primavera inmediatamente después del descostillado, luego de haber removido la tierra, y antes de la aparición de las malezas. Las malezas del invierno anterior deben ser removidas. (*) 1 sola aplicación.

Información General:

Terbacil es un herbicida selectivo para el control de malezas anuales en el cultivo de caña de azúcar de semilla, o "caña soca".
Sus efectos a menudo son lentos en hacerse notar, y pueden no ser evidentes hasta que el herbicida haya sido llevado por la humedad hasta la zona de las raíces de las malezas. El grado de control y la duración del efecto variarán de acuerdo a la cantidad de terbacil utilizada, tipo de suelo, lluvias y otras condiciones.
Los mejores resultados se obtienen cuando la aplicación se hace poco tiempo antes o después de que el crecimiento de las malezas se inicie. Si la vegetación es densa, eliminarla y aplicar sobre suelo desnudo.

Equipos y técnica de aplicación: puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres de arrastre o autopropulsadas, siempre que estén provistas de agitador. Emplear pastillas de abanico plano, y colocar filtros de malla 50 o más gruesos. Evitar la superposición de pasadas, ya que una dosis excesiva puede dañar el cultivo.
El agitador debe estar en funcionamiento constante para mantener el material en suspensión. Es preferible la agitación mecánica, aunque la agitación hidráulica es igualmente satisfactoria, si la bomba tiene el caudal suficiente como para devolver por lo menos el 5% de la capacidad del tanque por minuto, cuando el pulverizador está en movimiento.
NO usar agitación neumática.
Utilizar 150 a 200 l/ha de agua, para cubrir la superficie uniformemente, con una presión de trabajo de 30 a 40 libras/pulg2 (2 a 2,75 bar)

Restricciones: la planta tratada con terbacil no es apta para uso comestible, como tampoco para forraje.
Las áreas tratadas no deben ser sembradas hasta el año siguiente al uso de terbacil, pues esto podría resultar dañoso a las plantas cultivadas.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 1582 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 5,3 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.