TERBUTILAZINA

Marcas comerciales: KORITSU - TERBUTILAZINA SIGMA.

Nomenclatura Química:
terbutilazina: 2 - tert - butilamino - 4 - etilamino - 6 - cloro - 1,3,5 - triazina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Capín (*Echinochloa sp.*) Pata de ganso *(Eleusine indica)* Yuyo colorado *(Amaranthus sp.)*	2 L/ha + 100 cm3/ha de Tolpyralate 40% SC (BRUCIA) (*)	(**)	Hasta V6 del cultivo. Hasta 10 cm de altura en *Amaranthus sp.* y 10 cm de diámetro para *Echinochloa sp.* y *Eleusine indica.*

(*) Recomendación para PC KORITSU
(**) En post-emergencia del cultivo de Maíz: Maíz de grano: 108 días. Maíz de forraje: 46 días

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Capín (**) (*Echinochloa crus-galli)* Cerraja *(Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Ocucha (*) *(Parietaria debilis)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de cuaresma (**) (*Digitaria sanguinalis)* Pata de ganso (**) *(Eleusine indica)* Perejilillo *(Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra *(Conyza spp.)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyos colorados (*Amaranthus spp.)*	1,9 l/ha – 2,25 l/ha + 1,3 l/ha S-metolacloro 96% EC	(***)	Pre-emergencia del cultivo. La dosis de s-metolacloro corresponde a suelos de textura media.
Maíz				En pre-emergencia de malezas.
Maní				Pre-siembra y Pre-emergencia del cultivo. La dosis de s-metolacloro corresponde a suelos de textura media.
Arveja		1,5 l/ha – 2,1 l/ha		Pre-siembra del cultivo
Garbanzo Haba Lupino		1 l/ha – 1,5 l/ha		Pre-emergencia del cultivo.
Avena Cebada Centeno Trigo		1,5 l/ha		Pre-siembra del cultivo
Poroto Mung				Barbecho Químico – 120 días antes de la siembra
Barbecho químico (control malezas de hoja ancha)		1,5 l/ha – 2,25 l/ha		En pre-emergencia de malezas.
Citricos o Citrus (Limón, Naranja, Mandarina)		4 - 6 l/ha		En pre-emergencia de malezas.
Forestales (Eucaliptus sp. y Pinus sp.)		3 l/ha – 6 l/ha		Aplicar en pre-emergencia de malezas, en pre y post-plantación
Lenteja Vicia		1,5 l/ha – 2,1 l/ha		Pre-siembra del cultivo.
Vid		3,75 l/ha – 5,25 l/ha	(****)	Aplicar en pre-emergencia de malezas

(*) El control de Ocucha (Parietaria debelis) es realizado tanto en aplicaciones de preemergencia como de post-emergencia temprana de la maleza. Se recomienda la aplicación de al menos 1,5 L/ha de KORITSU en mezcla con glifosato para las aplicaciones de post-emergencia.
(**) El control satisfactorio de Capín (Echinocloa crusgalli), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis) y Pata de ganso (Eleusine indica) es realizado utilizando las dosis de 3,7 L/ha – 5,2 L/ha en el cultivo de vid; 4 L/ha – 6 L/ha en cítricos, o 4,5 L/ha – 6 L/ha en forestales; o en la mezcla de 1,9-2,2 L/ha de KORITSU con 1,3 L/ha de S-metolacloro 96% EC en las recomendaciones de maíz, maní, algodón. Las dosis menores o sin s-metolaclor tendrán un control parcial, pero con supresión del crecimiento de la maleza.
(***) Sin restricciones por uso posicionado
(****) Entre aplicación y cosecha debe pasar 135 días

Información General:

Es un herbicida que puede ser aplicado en preemergencia para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas mencionadas en esta etiqueta. Actúa a través de las primeras hojas, así como también por las semillas germinadas de las malezas e impide su crecimiento por varios meses. Aplicado en pre emergencia el herbicida es absorbido por las semillas en germinación. Bloquea el transporte de electrones, impidiendo la fotosíntesis y, consecuentemente la formación y acumulación de almidón.
En aplicaciones post-emergentes tempranas puede ser utilizado, pues, aunque en menor medida, también es absorbido por cotiledones y primeras hojas.

Para un buen efecto herbicida es fundamental un buen tenor de humedad en el suelo al momento de la aplicación, así como una adecuada preparación de la cama de siembra y lluvias posteriores para facilitar la incorporación del herbicida en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo.

Equipo y caudal de aplicación:
Debe ser aplicado con equipo terrestre de arrastre o autopropulsión correctamente calibrado cuya barra esté provista de picos de abanico plano. Se deberá lograr un volumen de aplicación de 80 a 100 L/ha y se deberá trabajar con una presión de 40 a 60 lb/pulg2 de manera de lograr 30-40 gotas/cm2.

Para el producto TERBUTILAZINA SIGMA:
Puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos cuidando que la cobertura sea correcta y uniforme, con caudales mínimos de 80 L/ha (300 litros/ha en citrus) y 20 lt/ha, respectivamente. Para el cultivo de maíz trabajar con aplicación terrestre con un volumen de caldo de 100-130 L/ha y con una velocidad del viento menor de 10 km/hora. Trabajar con presión de 25-40 libras, a fin de lograr una gota gruesa y evitar la deriva. La presión de los picos no debe ser inferior a 2,1 kg/cm2. Se recomienda lograr en la aplicación del producto un mojado de 20 a 30 gotas/cm2.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento. Añadir la cantidad necesaria del producto directamente al tanque y sin dilución previa. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre el producto al tanque en primer lugar. Usar este producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

Compatibilidad:
En pruebas de compatibilidad realizadas a pequeña escala en laboratorio, el producto no ha manifestado incompatibilidad con otros plaguicidas autorizados para los mismos usos, excepto con aquellos de fuerte reacción alcalina. Antes de utilizar en mezcla con otros productos, se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.
Evitar la aplicación en mezclas con glifosato sal potásica por posibilidad de incompatibilidad física y biológica parcial. Se recomienda su mezcla con glifosato sal dimetilamina o sal monoamónica.

Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de aplicado el producto.

Derrames:
En caso de derrames tanto del producto puro como del caldo de aplicación cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 5 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 2000-2160 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: >1,41 mg/L
Sensibilización de la piel: NO SENSIBILIZANTE
Mutagénesis: NO MUTAGENICO.

Inhalación: Alejar al paciente del lugar de exposición y brindarle asistencia posterior por médico. Si la respiración es di-cultosa, dar oxígeno.
Piel: Quitar inmediatamente toda la ropa y calzado contaminado. Lavar con abundante agua y jabón las zonas del cuerpo que hubieran tomado contacto con el producto.
Ojos: Lavar con abundante agua o solución fisiológica durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona posee lentes de contacto, quitarlas de ser posible. Posterior control oftalmológico.
Ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente. Trasladar a la persona a un centro asistencial.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico

Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Antídoto: no se registra antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
KORITSU	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	40941	SC	50%	III
TERBUTILAZINA SIGMA	SIGMA AGRO SA	40852	SC	50%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.