TIABENDAZOL

Marcas comerciales: TECTO 50 SC.

Nomenclatura Química:
tiabendazol: 2-(4-tiazolil) - benzimidazol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: bencimidazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo Cebolla	Podredumbre blanca (*Sclerotium cepivorum)*	170 - 335 cm3/hl	15	Inmersión pre-plantación: sumergir la semilla (bulbo) o la plántula de cebolla en la suspensión, durante 10 - 15 minutos. Secar a la sombra.
		2350 cm3/ha 2350 cm3/hl		Aspersión: aplicar en tres aspersiones directas a la base de la planta (cuello) cada 30 días, comenzando cuando las plantas tengan 20 a 25 cm de altura.
		3350 cm3/ha 3350 cm3/hl		Aspersión al suelo, pre plantación: aplicar en aspersión directa al suelo antes de plantar o en el surco al trasplantar.
Arroz	Quemado del arroz (*Pyricularia oryzae)*	420 - 590 cm3/ha		Aspersión foliar: realizar tres aplicaciones mediante pulverización, a intervalos de 14 - 21 días desde la formación de la panoja.
Banano o plátano	Podredumbre de la corona (*Colletotrichum musae)* Podredumbre de la semilla y la corona (*Fusarium spp.)*	45 - 85 cm3/hl	(*)	Inmersión/aspersión post-cosecha: tratar la fruta inmediatamente después del corte por pulverización o por inmersión antes del empaque.
Bulbos ornamentales (gladiolos, tulipanes, iris y narcisos)	Moho azul en bulbos almacenados (*Penicillium spp.)* Podredumbre basal (*Fusarium spp.)*	190 cm3/hl		Inmersión post cosecha: aplicar después de la cosecha, sumergiendo los bulbos en la suspensión durante 15 minutos.
Césped	Fusariosis del césped (*Fusarium nivale)* Mancha en rueda del césped (*Sclerotinia spp.)* Mancha marrón del césped (*Rhizoctonia solani)*	40 - 60 cm3/100 m2 en 30 l de agua.		Aspersión foliar: iniciar las aplicaciones ante los primeros síntomas de enfermedad. Pulverizar a intervalos de 7 a 14 días hasta controlar la enfermedad.
Cítricos o citrus	Melanosis (*Phomopsis citri)* Moho azul de los citrus (*Penicillium italicum)* Moho verde de los citrus (*Penicillium digitatum)* Podredumbre peduncular de los citrus (*Diplodia natalensis)*	100 - 1000 cm3/hl		Aplicación post cosecha por aspersión: pulverizar la fruta durante el proceso de selección y lavado antes del empaque.
Manzano	Antracnosis (*Gloeosporium spp.)* Moho azul (*Penicillium spp.)* Moho gris (*Botrytis spp.)*	100 - 170 cm3/hl		Aspersión post-cosecha: aplicar por pulverización sobre la fruta, antes del empaque.
	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)* Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	34 - 67 cm3/hl 850 - 1680 cm3/ha	15	Aspersión foliar: pulverizar al iniciarse la brotación. Repetir cada dos semanas hasta la cosecha.
Membrillero Peral	Antracnosis (*Gloeosporium spp.)* Moho azul (*Penicillium spp.)* Moho gris (*Botrytis spp.)*	100 - 170 cm3/hl	(*)	Aspersión post-cosecha: aplicar por pulverización sobre la fruta, antes del empaque.
Papa	Fusariosis (*Fusarium spp.)* Gangrena de la papa (*Phoma exigua var. foveata)* Podredumbre seca (*Oospora pustulans)* Sarna plateada de la papa (*Helminthosporium solani)*	4000 cm3/hl		Aspersión al tubérculo post-cosecha: por cada tonelada de papas preparar 2 litros de suspensión y aplicar mediante pulverización sobre los tubérculos inmediatamente después de cosechados. En escala industrial: adaptar máquinas lavadoras y/o bandas transportadoras con picos pulverizadores.
	Sarna negra	2270 cm3/ha		Aspersión a la siembra: pulverizar sobre las papas semilla directamente en el fondo del surco.

	(*Rhizoctonia solani)*	335 cm3/hl		Inmersión pre siembra: sumergir los tubérculos (papa semilla) tres minutos en la suspensión preparada.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)* Mancha angular del poroto (*Phaeoisariopsis griseola)*	630 cm3/ha	15	Aspersión foliar: comenzar las aplicaciones al observar las primeras manchas en las hojas. Repetir la pulverización a los 15 - 20 días.
Soja	Complejo patológico (*Colletotrichum spp.)* Complejo patológico (*Cercospora spp.)* Complejo patológico (*Diaporthe spp.)* Complejo patológico (*Phomopsis spp.)* Complejo patológico (*Septoria spp.)*	420 - 590 cm3/ha		Aspersión foliar: realizar dos aplicaciones foliares: 1°) al iniciarse la formación de las vainas (R3) 2°) 2 - 3 semanas después.
Trigo	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Golpe blanco (*Giberella zeae)* Septoriosis (*Septoria spp.)*	420 - 630 cm3/ha		Aspersión foliar: aplicar a comienzos de floración (Zadoks 6.1 - 6.5). Repetir de 10 a 15 días después.

(*) Exentos de período de carencia. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida sistémico de amplio espectro, altamente efectivo contra una gran variedad de hongos patógenos que afectan a las plantas y a los frutos. Puede administrarse en pre-cosecha, post-cosecha, como así también para tratamiento de bulbos.

Preparación
Suspensión concentrada que debe ser aplicada diluida en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Limpiar y calibrar adecuadamente el equipo antes de utilizarlo.
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación. Añadir la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo. Se debe utilizar la cantidad de agua necesaria, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo. Evitar que se produzca escurrimiento del producto por exceso de agua. Seguir las indicaciones específicas para cada cultivo, indicadas en el cuadro de recomendaciones. Tener en cuenta el cálculo de la dosis correspondiente por hectárea, según se realicen aplicaciones de alto, medio o bajo volumen.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos.
NO realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones de uso:
Período de carencia: dejar transcurrir como mínimo 15 días entre la última aplicación y la cosecha de ajo, cebolla, arroz, manzana, poroto, soja y trigo. Los cultivos de banana, bulbos ornamentales, césped, cítricos, papa, pera y membrillos, se encuentran exentos de período de carencia. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento.

Compatibilidad: compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. Igualmente, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 8.2 mg/l

Leve irritante dermal ni ocular. Sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Muy tóxico para peces y organismos acuáticos.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad de al menos 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
NO contaminar alimentos, forrajes ni fuentes de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TECTO 50 SC	SYNGENTA AGRO	33546	SC	50%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.