TIOFANATO METIL

Marcas comerciales: TOPSIN TOP

Nomenclatura Química:
tiofanato metil: 1,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno o dimetil 4,4'-(o-fenileno)bis(3-tioalofanato).
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzimidazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Almendro Pelón	Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)* Viruela de la púa *(Fusicoccum amygdali)*	PC 50%: 140 cm3/hl	10	1° aplicación: yema hinchada. 2° aplicación: a la caída de los pétalos. 3° aplicación: con frutos de 0,3 cm de diámetro. 4° aplicación: poco antes de la cosecha.
Apio	Mal de los almácigos (*Fusarium spp.)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*			Mezclar con el suelo antes de la siembra o regado sobre el almácigo 2 l/m2.
	Viruela del apio (*Cercospora apii)*		10	Aplicación preventiva cada 20 días o con los primeros síntomas cada 12 - 15 días.
Berenjena Pimiento Tomate	Mal de los almácigos (*Fusarium spp.)* Mal de los almácigos (*Rhizoctonia spp.)*		N/C	Mezclar con el suelo antes de la siembra o regado sobre el almácigo 2 l/m2. Se recomienda aplicar en mezcla con Penclor o Captan.
Campos de Golf Campos deportivos Césped	Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Mancha marrón del césped (*Rhizoctonia solani)*			Mezclar con el suelo antes de la siembra o regando el almácigo con 2 l de caldo/m2. Se recomienda aplicar en mezcla con PCNB.
Duraznero	Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)*		10	1° aplicación: yema hinchada. 2° aplicación: a la caída de los pétalos. 3° aplicación: con frutos de 0,3 cm de diámetro. 4° aplicación: poco antes de la cosecha.
	Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*	PC 50%: 100 cm3/hl		Iniciar el tratamiento a la caída de los pétalos. Repetir el tratamiento con frutos de 3 a 3,5 cm. de diámetro.
Florales	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*		N/C	Aplicar al observar los primeros síntomas y repetir cada 12 - 15 días.
Frutilla			10	Iniciar la aplicación antes de la primera floración. Continuar las aplicaciones pulverizando antes de cada floración.
Maní	Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	Ver M.A.		1) Aplicación preventiva: En banda: Primera aplicación: a los 15 - 20 días de nacido, aplicar 350 cm3/ha de la formulación SC 50% o 250 g/ha de la formulación PM 70%. Segunda aplicación: al iniciarse la floración, aplicar 700 cm3/ha (SC 50%) o 500 g/ha (PM 70%). Tercera aplicación: inmediatamente después de la primera "clavada", aplicar 1000 cm3/ha (SC 50%) con 200 - 250 l/agua o 500 a 710 g/ha (PM 70%). Aplicación total: En las aplicaciones de cobertura total las dosis a usar son 700 a 1000 cm3/ha (SC 50%) o 500 a 710 g/ha (PM 70%). 2) Aplicación curativa: aplicar 1400 cm3/ha (SC 50%) o 1000 g/ha (PM 70%) al observarse las primeras manchas de viruela. Repetir las aplicaciones cada 2 semanas.
Manzano	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	PC 50%: 140 cm3/hl	10	1° aplicación: antes de la caída de hojas. 2° aplicación: a yema hinchada. 3° aplicación: a la caída de pétalos. 4° aplicación: con frutos de 1,5 cm de diámetro. Comenzar a aplicar antes del cuaje de los frutos. Repetir a los 30 días.
Cítricos	Mancha grasienta de los citrus *(Mycosphaerella citri)*			Comenzar a aplicar antes del cuaje de los frutos. Repetir a los 30 días.
Melón Pepino Sandía Zapallito Zapallo	Oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea)*			Aplicar al observar los primeros síntomas y repetir cada 12 - 15 días.

Ornamentales	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	PC 50%: 100 cm3/hl	N/C	Aplicar al observar los primeros síntomas y repetir cada 12 - 15 días.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)* Mancha angular del poroto (*Phaeoisariopsis griseola)*	PC 50%: 750 cm3/ha	10	Aplicar a los 50 a 60 días de la siembra, con 10 a 15 l de agua (aplicación aérea), 50 - 60 días de la siembra, o 150 a 200 l de agua (aplicación terrestre).
	Esclerotinia del poroto (*Sclerotinia sclerotiorum)*	PC 50%: 750 a 1000 cm3/ha		Iniciar las aplicaciones a los 30 días de la siembra. Repetir las aplicaciones a los 12 a 15 días. Total 3 aplicaciones.
Rosales	Oídio del rosal (*Sphaerotheca pannosa)*	PC 50%: 100 cm3/hl	N/C	Desde la aparición de las primeras hojas, hasta la finalización de la cosecha, con intervalos de 12 - 15 días.
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Podredumbre de semilla (*Phomosis sojae)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	PC 50%: 750 a 1000 cm3/ha	20	Dos aplicaciones, para mejorar el rendimiento y la calidad de la producción. Primera aplicación: desde inicio de formación de vainas (R3) Dosis: 0,75 a 1,0 l/ha. Segunda aplicación: con vainas o chauchas 25 a 50% de llenado de granos (R 5,3 - R 5,4). La dosis de 1,0 l/ha en la primera y/o en la segunda aplicación se realizará en condiciones de alta humedad relativa y alta temperatura. Una aplicación sólo para mejorar la calidad de la semilla: vainas o chauchas a estado de 50% hasta fin de llenado de granos.
Trigo	Golpe blanco (*Fusarium graminearum)*	PC 50%: 700 cm3/ha	30	Realizar la aplicación en el momento de la espigazón. Repetir la aplicación en el período de plena floración.

Información General:

El tiofanato metil es un fungicida bencimidazol sistémico, de acción preventiva y curativa de enfermedades del fin de ciclo en soja; fusariosis en trigo; oídios, sarnas, mohos y podredumbres provocadas por Sclerotinia spp. y Botrytis spp. en las especies indicadas en las instrucciones de uso.

Equipos de aplicación: en aplicaciones foliares puede ser aplicado con equipos pulverizadores de alto y bajo volumen.
El volumen de aplicación debe ser de no menos de 200 l/ha de agua en aplicaciones terrestres y de 20 l/ha en aplicaciones aéreas. En aplicaciones terrestres, utilizar preferentemente pastillas del tipo cono hueco, con una presión de 60 a 80 libras por pulgada cuadrada, tratando de obtener de 20 a 30 gotas por cm2. También se pueden utilizar aplicaciones de ultra bajo volumen con equipos adecuados para esos tipos de tratamientos. Con equipos de alto volumen aplicar hasta inicio de goteo.

RECOMENDACIONES DE USO: Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor a 40 %, Viento mayor a 15 Km/h.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los plaguicidas, con excepción de los de muy fuerte reacción alcalina, como el Caldo Bordelés y Polisulfuro de Calcio. Consultar con un ingeniero agrónomo.
Las semillas tratadas no deben usarse como alimento ni forraje, tampoco para extracción de aceite. La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley Nro. 18073.

FITOTOXICIDAD: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
En el caso de derrames del producto sin diluir, barrer y juntar el producto. Preparar una dilución al 5-10% y aplicarla sobre alambrados y zonas no cultivadas como caminos y senderos que no afecten la diversidad ambiental siendo útil para eliminar malezas.
Los derrames de productos líquidos se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 50% SC:

DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata).
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata).
CL50 Inhalación: 5.120 mg/l (rata).

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Debilmente sensibilizante

Riesgos ambientales: producto virtualmente no tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para organismos acuáticos. Evite contaminar estanques y fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOPSIN TOP	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	33180	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.