TIOFANATO METIL + TIRAM

Marcas comerciales: TOPSEED.

Nomenclatura Química:
tiofanato metil: dimetil [(1,2-phenylene(bis(iminocarbonothionyl)] biscarbamato
tiram: bis(dimetilthio-carbamoyl)disulfide
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: benzimidazol + dimetilditiocarbamato
Acción: de contacto y sistémica.

Uso:

Cultivo	Adveridad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum*) Fusariosis (*Fusarium spp.)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii*) Podredumbre de semilla (*Phomopsis spp*.)	300cc/qq		El tratamiento de semilla deberá realizarse en el momento previo a la siembra.

* La inoculación con Rhizobium spp, se deberá efectuar después del tratamiento con TOPSEED, a igual que con cualquier terápico de semilla.

Información General:

TOPSEED es un fungicida que posee acción sistémica y de contacto. No afecta la germinación ni la emergencia del cultivo. El tiofanato metil es un fungicida bencimidazol sistémico, ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades. El tiram, un ditiocarbamato, por su acción de contacto realiza una eficaz protección preventiva.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN:

TOPSEED debe ser aplicado exclusivamente por tratamiento húmedo. Para lograr una distribución homogénea del producto sobre la semilla, suspender la dosis indicada en 400 cm3 de agua para 100kg de semilla

EQUIPO, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACION:

Agite antes de usar. Para su aplicación emplear tambores rotativos con ejes excéntricos y con aletas interiores fijas para facilitar la mezcla del producto con las semillas y que estas resulten totalmente cubiertas. Colocar la mitad de las semillas a tratar en el tambor, luego agregar la mitad de la suspensión preparada y girar suavemente. Completar la cantidad de las semillas a curar y agregar el resto de la suspensión de TOPSEED, volver a hacer girar suavemente el tambor.

Para tratar grandes cantidades emplear plantas curadoras de semillas utilizando los volúmenes de aplicación y especificaciones técnicas del fabricante.

RECOMENDACIONES DE USO:

No requiere periodo de espera entre la aplicación y la siembra. El tratamiento de semilla deberá realizarse en el momento previo a la siembra.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá ser barrido y colocado en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales. Lavar las superficies 2 contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 1 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Carga del equipo: usar protector facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.

Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:
Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilizante dermal: No sensibilizante.

RIESGOS AMBIENTALES:
Abejas: ligeramente tóxico. (Por el uso del producto como terápico para semillas no se produce exposición).
Aves: prácticamente no toxico.
Peces y organismos acuáticos: extremadamente tóxico. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 10 metros. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. No realizar mezclas cerca de fuentes de agua natural ni artificial. No contaminar fuentes de agua con remanentes del producto, ni con el líquido de limpieza del equipo. Para reducir la deriva del producto, aplicar preferentemente durante las primeras horas de la mañana y últimas horas del atardecer, con vientos inferiores a los 7 km/h.
.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TOPSEED	SUMMIT AGRO ARGENTINA	33896	FS	10% + 24%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.