TOLCLOFOS METIL

Marcas comerciales: RIZOLEX FLO – RIZOLEX TOP.

Nomenclatura Química:
tolclofos metil: 0-2,6 dicloro-4-metilfenil 0,0 dimetil fosforotioato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: clorofenilo.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: fungicida (terápico para tratamiento de semillas).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Pythium ultimum)*	300 cm3/100 kg de semilla en mezcla con tiram.	N/C	Desde 6 meses antes, hasta el momento de la siembra. En tratamiento de la semilla mezclar el producto con 300 cm3 de tiram 36%, o 400 cm3 de tiram 25%, o 200 cm3 de tiram 48% cada 100 kg de semilla.
Papa (semilla)	Sarna negra (*Rhizoctonia solani)*	200 cm3/hl		En tratamiento de pulverización. En tratamiento en el surco, con tubérculos ya sembrados 1,5 a 2 l/ha.
		400 cm3/hl		Desde 6 días antes de la siembra hasta el momento de ésta. En tratamientos de baño de inmersión.

Información General:

Es un fungicida órgano-fosforado que inhibe la biosíntesis de los fosfolípidos en las células de los hongos, inhibe la germinación de las esporas e impide el desarrollo del micelio de los hongos presentes tanto en la semilla como en el suelo.
Es de uso preventivo y curativo, controlando la sarna negra de la papa y en mezcla con tiram controla los hongos del complejo Dumping off en algodón.

Métodos de aplicación:
Papa semilla en baño de inmersión: llenar con agua hasta las 3/4 partes de la capacidad de la batea o piletón de baño; agitar adecuadamente y agregar la cantidad de producto previamente calculada. En esta suspensión, mediante un canasto, sumergir durante 3 minutos los cortes de papa o los semillones enteros. Dejar escurrir y secar la papa tratada antes de plantarla.
Refuerzo de la suspensión gastada: por cada 100 litros de agua de baño a reponer, agregar 440 cm3 de producto.
Con 1000 litros de baño por inmersión se pueden tratar de 300 a 400 bolsas de papa. No utilizar el baño por más de 2 días.
Papa semilla en tratamiento por pulverización: por cada 10 litros de agua, agregar 20 cm3 de producto (o sea 200 cm3/hl). Con 10 litros de suspensión preparada tratar 100 kg de cortes de papa. Dejar orear (secar) y luego sembrar.
Cuando se tratan grandes cantidades de semilla, adaptar el equipo de pulverización bien calibrado en las máquinas lavadoras y/o cintas transportadoras.
Semilla de algodón en tratamiento húmedo: dosis para tratar 100 kg de semilla deslintada. Para el control del complejo de hongos Dumping off se recomienda la siguiente mezcla: 300 cm3 de tolclofos metil + 400 cm3 de tiram 25% o 300 cm3 de tiram 36% o 200 cm3 de tiram 48%.
En tambor rotativo con eje excéntrico, agregar la dosis recomendada de la mezcla, suspendida en 1 a 1,2 litros de agua para tratar 100 kg de semilla deslintada. Hacer girar el tambo durante 10 minutos a una velocidad moderada (50 a 60 revoluciones por minuto).
Cuando se trata grandes cantidades de semilla, emplear curadoras especiales específicas que disponen de un sistema de agitación.

Restricciones de uso: como terápico para el tratamiento de semillas, se encuentra exento de período de carencia. La papa "semilla" tratada, no debe bajo ningún concepto, ser usada para el consumo humano y/o animal. La venta de papa curada para otro destino que no sea la siembra, esta penada por la Ley Nº 18.073.

COMPATIBILIDAD: puede ser mezclado con suspensiones concentradas que tengan recomendaciones para el tratamiento de semillas de los cultivos antes citados.
FITOTOXICIDAD: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes a la dosis recomendada

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Carga del equipo: usar protector facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 5000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en conejo: > 2000 mg/kg.
CL50 inhalatoria en rata 1,07 mg/l

Irritación dermal:	No Irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Advertencia: si bien el producto es fosforado, la aplicación de atropina puede no ser efectiva para disminuir la intoxicación aguda con tolclofos metil. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático incluyendo lavaje gástrico y respiración artificial.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para aves. Ligeramente tóxico para peces. Mantener el producto alejado de lagunas, ríos y arroyos. Evitar la contaminación, no arrojar deshechos ni limpiar equipos en los cursos de agua. No se espera exposición para abejas por su uso como terápico para tratamiento de semillas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RIZOLEX FLO	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	33540	FS	50%	III
RIZOLEX TOP	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41286	FS	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.