TRIASULFURON

Marcas comerciales: LOGRAN.

Nomenclatura Química:
triasulfurón: 3-(6-metoxi-4-metil-1,3,5-triazina-2-il)-1-(2-(2-cloroetoxi-fenilsulfonil)-urea
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Capiquí (*Stellaria media)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)*	10 g/ha + 100 - 200 cm3/hl de agua de humectante no iónico (*)	(**)	Post-emergencia temprana: Aplicar cuando el cultivo de trigo se encuentra entre 3 y 5 hojas y las malezas desde cotiledón hasta 4 hojas verdaderas (activo crecimiento). (*) Con infestaciones importantes de Polygonum aviculare o Chenopodium album, agregar 80 - 100 cm3/ha dicamba 57,71% o 80 - 100 cm3/ha de picloram 24%.

(**) Entre el momento de aplicación y la cosecha deberán transcurrir los siguientes días: trigo para grano: 60 días; trigo para forraje: 21 días. En caso que los granos o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos (LMR) del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Herbicida selectivo para el cultivo del trigo, compuesto por el ingrediente activo triasulfuron, perteneciente a la familia de las sulfonilureas. Aplicado sobre las malezas en post-emergencia temprana, con condiciones adecuadas para su activo crecimiento y con buena humedad, inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles, observándose los síntomas de mortandad a las 2 o 3 semanas de la aplicación. Un solo tratamiento, realizado en el momento recomendado, controla un amplio espectro de malezas que afectan las primeras etapas del cultivo de trigo.

Preparación: granulado dispersable que se disuelve en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa.
- Corroborar la correcta dispersión del producto.
- Completar el tanque con agua, hasta el volumen deseado.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el caldo preparado dentro de las 24 horas de la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Utilizar siempre agua limpia.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe aplicarse en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 20-30 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas. Para aplicaciones terrestres se recomienda aplicar un volumen de 90 a 100 l/ha, con presión de 30-40 lb/pulg2 y picos del tipo abanico plano. Para aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de 15 litros de agua por hectárea.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Aditivos: para lograr la máxima eficacia, se recomienda aplicarlo acompañado de humectante no iónico en una concentración 0.1-0.2% (100-200 cm3/100 litros de caldo).

Recomendaciones de uso: los mejores resultados se obtienen aplicando este producto cuando las malezas se encuentran en activo crecimiento y con buenas condiciones de humedad. Triasulfuron inhibe rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles. Se observarán síntomas de muerte de malezas recién a las 2 o 3 semanas de aplicación.

Restricciones de uso: en caso de pérdida de cultivo de trigo por cualquier razón, sólo podrá sembrarse trigo en el suelo tratado con triasulfurón.
NO se recomienda utilizar triasulfurón en suelos con pH superior a 7.
NO aplicar este producto en condiciones severas de estrés: sequía, heladas inminentes, inundaciones, etc. No utilizar en trigos sembrados con pasturas de leguminosas y gramíneas.

Rotación de cultivos: cultivos diferentes a trigo y cebada pueden ser sensibles, aún en bajas concentraciones de triasulfuron en el suelo. Por lo tanto, deberá prestarse atención a los planes de rotación de cultivos antes de usar este producto. Se define como intervalo mínimo de resiembra al período que debe transcurrir entre la aplicación de triasulfurón y la fecha de siembra del cultivo siguiente. Dejar transcurrir los siguientes intervalos antes de la siembra de cada cultivo: soja: 3 meses; girasol: 12 meses; maíz: 12 meses; avena: 6 meses; otros: 24 meses.

Período de carencia: entre el momento de aplicación y la cosecha deberán transcurrir los siguientes días: trigo para grano: 60 días; trigo para forraje: 21 días. En caso que los granos o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos (LMR) del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: no debe aplicarse mezclado con otros agroquímicos como fertilizantes, insecticidas o fungicidas que no estén recomendados en esta etiqueta. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no se han observado síntomas de fitotoxicidad por este producto en el cultivo de trigo, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y adsorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto adsorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (conejo)

Leve irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.
NO aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LOGRAN	SYNGENTA AGRO	31801	WG	75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.