TRICLORO ACETATO DE SODIO

Nomenclatura Química:
tricloro acetato de sodio.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido alifático.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	13 kg/ha	13	En tratamientos de pre y/o post emergencia. La cantidad indicada de producto será aplicada en un volumen de agua entre 600 y 800 l/ha.
Áreas sin cultivo	Agropiro invasor, Grama menor, Grama oficinal, Cruera, Crouch grass (*Elytrigia repens)*	25 kg/ha	25	Combinar el tratamiento con laboreos del suelo y aplicar después de arar y rastrear.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebadilla (*Bromus mollis)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Gramillón (*Stenotaphrum secundatum)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	12 - 15 kg/ha		En aplicación pre emergente, se puede llegar a controlar, sin matar a los pastos. Igual control se consigue en tratamientos de post emergencia con pastos tiernos. La duración de la efectividad del tratamiento es variable, repitiendo el mismo de ser necesario.
		50 - 100 kg/ha		Fin de invierno y comienzo de primavera, al iniciarse el crecimiento.
	Carrizo (*Phragmites australis)*	100 - 125 kg/ha		Aplicar en pleno desarrollo de la maleza.
	Colas de zorro (*Setaria viridis)* Totora (*Typha spp.)*	150 - 200 kg/ha		Fin de invierno, principio de primavera.
	Gramilla mansa (*Cynodon hirsutus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)*	75 - 125 kg/ha		Arar y rastrear antes de aplicar, cuando la gramilla vegeta activamente.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*	50 - 125 kg/ha		Arar y rastrear bien el suelo afectado por la maleza, o practicar un corte bajo y aplicar luego, cuando los rebrotes tengan 15 - 20 cm de altura.
Caña de azúcar	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Cebadilla (*Bromus mollis)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Gramilla dulce (*Paspalum distichum)* Gramillón (*Stenotaphrum secundatum)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*	10 - 14 kg/ha		Si el tratamiento se hace sobre las hileras y la hectárea tiene 55 - 60 surcos de 100 metros cada uno, puede aplicarse 0,25 a 0,5 kg por surco. Emplear dosis menores, sobre la hilera de plantación sin mojar la caña, y la dosis mayor, sobre la trocha. Para controlar malezas de hoja ancha, mezclar con 2,4 D a razón de 70 - 100 cm3 por surco.
Lino		7,5 - 11,5 kg/ha		Cuando los pastos no lleguen a 5 cm de altura y el lino entre 7 a 15 cm. Se puede aplicar combinado con 2,4 D.

Información General:

Es un herbicida muy soluble en agua, de pre y post-emergencia, que actúa en la planta penetrando por el follaje y por las raíces donde ejerce su mayor acción. Las malezas cambian de coloración y luego mueren. Sus efectos son muy lentos en condiciones secas y poco persistentes en condiciones húmedas.
Es más efectivo cuando hay humedad en el suelo. Sin embargo, no aplicar cuando se prevean lluvias antes de 10 horas.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores cerrados e identificados para su disposición en sitios autorizados de acuerdo a las regulaciones locales. No incinerar a cielo abierto. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): Ø (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Aplicar tratamiento sintomático.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.