TRIFLOXISTROBIN

Marcas comerciales: FLINT 50 WG - TWIST 50 SC.

Nomenclatura Química:
trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino-oximetil]-fenil}-metiléster del ácido acético.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina.
Acción: de contacto y mesostémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Frutales de pepita (Manzano)	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)* Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	12 g/hl	14	El producto debe ser aplicado de acuerdo a los servicios de alarma o bien ante la aparición de condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, en el período de máxima susceptibilidad del cultivo, esto es durante la floración. No reiterar las aplicaciones por más de tres veces. Combinar el plan de curas con productos de diferente modo de acción.
Limón Pomelo	Mancha negra (*Guignardia citricarpa)*	10 o 30 g/hl	(*)	La aplicación debe ser realizada a partir de los 60 días posteriores a la caída de los pétalos y hasta un máximo de 90 días de dicho período fenológico. Dosis de 30g/hl: recomendada para aplicaciones en Bajo volumen, según cálculo del caldo/ha, mediante método TRV (Tree Row Volume). La aplicación debe ser realizada agregando al caldo de aplicación Aceite emulsionable mineral en la proporción de 1 0/00 (uno por mil). Se recomiendan realizar aplicaciones combinadas con oxicloruro de cobre o hidróxido de cobre.
Mandarina (Satsumas y Clemenules)	Sarna de los Citrus (*Elsinoe australis)*	10 g/hl	30	Las aplicaciones deben ser iniciadas en el período fenológico de botón temprano, de acuerdo al plan de curas preestablecido. No se recomienda aplicar en más de una oportunidad. Algunas estrategias productivas recomiendan una segunda aplicación del producto en el momento de la caída de pétalos o cuaje de frutos. Se recomienda utilizar en rotación con otros productos de diferente modo de acción a las estrobilurinas para evitar la aparición de resistencias.
Mandarina (Tangor, Murcott y Nova)	Alternaria (*Alternaria spp.)*			La aplicación debe ser realizada a los 60 días posteriores a la caída de los pétalos. Es decir, cuando el 75 % de los frutos poseen un diámetro ecuatorial de aproximadamente 35 mm.
Naranja	Mancha negra (*Guignardia citricarpa)*	10 o 30 g/hl	(*)	La aplicación debe ser realizada a partir de los 60 días posteriores a la caída de los pétalos y hasta un máximo de 90 días de dicho período fenológico. Dosis de 30g/hl: recomendada para aplicaciones en Bajo volumen, según cálculo del caldo/ha, mediante método TRV (Tree Row Volume). La aplicación debe ser realizada agregando al caldo de aplicación Aceite emulsionable mineral en la proporción de 1 0/00 (uno por mil). Se recomiendan realizar aplicaciones combinadas con oxicloruro de cobre o hidróxido de cobre.
	Mancha negra de los cítricos (*Phyllosticta citricarpa)*	10 g/hl		
Papa	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	100 a 150 g/ha	15	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir ante la presencia de condiciones predisponentes. Cuando exista el riesgo del ataque simultáneo de Phytophtora infestans (tizón tardío), se recomienda el uso en mezcla de tanque con propineb, propamocarb, fosetil aluminio o propineb + iprovalicarb. Trifloxistrobin no controla esta enfermedad.
Poroto	Mancha angular (*Ascochyta spp.)* Mancha angular (*Phaeoisariopsis griseola)*	125 g/ha	40	A la aparición de los primeros síntomas.

(*) Uso posicionado.

Información General:

Trifloxistrobin es un fungicida foliar que actúa por contacto poseyendo una notable acción mesostémica, mantiene por más tiempo el cultivo sano y verde, con el consecuente mejoramiento en el rendimiento final.
El producto es absorbido rápidamente por hojas y tallos verdes. Posee efecto residual de protección del cultivo.
Trifloxistrobin tiene actividad mesostémica caracterizada por una alta afinidad con las cerosidades de la superficie de las hojas, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar. Trifloxistrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal.
Este producto debe ser utilizado en forma preventiva.

Preparación:

Agregar agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad, y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida de producto al tanque y continuar la agitación, completando el llenado del tanque con agua.

Técnicas y equipos de aplicación:
Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto de un sistema de agitación adecuado.
El volumen de aplicación deberá ser de 200-400 l/ha de agua para el cultivo de papa, trabajando con una presión 60 lb/pulg2 para lograr un buen mojado de las plantas. En poroto aplicar de 160 a 200 l/ha, mojando uniformemente el cultivo para poder lograr de 50-70 impactos de gotas/cm2.
Para frutales de pepita el caudal estará acorde al tipo de conducción que se haga del cultivo (monte libre o espaldera) y el cálculo del mismo según sistema TRV (Tree Row Volume).
En frutales cítricos, dependerá de la especia a tratar.
Para los casos cultivos frutales debe tenerse en cuenta que las dosis son referenciales para los caudales de aplicación usuales debiendo ser la dosis mínima por hectárea de producto equivalente a 150 g/ha.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
NO realizar las aplicaciones en las horas de más calor del día; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia inminente.

Advertencias:
NO aplicar cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
NO aplicar, si se espera una lluvia inminente, ya que el control puede ser no satisfactorio.

Estrategia anti-resistencia:
De modo tal de evitar la aparición de cepas de hongos resistentes, se recomienda no aplicarlo más de tres veces consecutivas durante un ciclo de producción.

Compatibilidad:
Es compatible con propineb, propamocarb clorhidrato, fosetil aluminio, propineb + iprovalicarb, tiacloprid, imidacloprid, deltametrina, metamidofos, oxicloruro de cobre, triflumuron.
NO aplicar trifloxistrobin en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala de compatibilidad física de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.
NO hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo. Se debe tener la precaución que al realizar estas mezclas el orden de adición de productos deberá ser el que se describe a continuación:
Tipo de formulación: WP, WG, SC, EC y SL.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
En caso de derrame del producto sólido sin diluir, barrer y juntar el producto e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del formulado 50%

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 4,65 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante potencial

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico.

Se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de 1 metro. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. No contaminar alimentos y forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FLINT 50 WG	BAYER	33967	WG	50%	III

TWIST 50 SC	BAYER	34428	SC	50%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.