Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

TRIFLOXISTROBIN + PROPICONAZOLE

Marcas comerciales: STRATEGO.

Nomenclatura Química:
trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino-oximetil]-fenil}-metil éster del ácido acético.
propiconazole:1-(2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il-metil)-1H-1,2,4-triazol
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica y mesostémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común Cebada Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Oídio del trigo (*Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	600 - 800 cm3/ha	35	Al inicio de la aparición de la plaga, cuando el 10% de las plantas presentan síntomas.
Soja	Antracnosis de la soja (*Colletotrichum glycines)* Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Quemado de la hoja (*Diaporthe phaseolorum var. sojae)*	400 cm3/ha + aceite coadyuvante (*)	20	Una sola aplicación entre estados R3 (inicio de formación de vainas) y R5 (Máximo tamaño de las mismas), cuando se observe la presencia de síntomas.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas.

(*) Agregar 500 cm3/ha de aceite coadyuvante en aplicaciones terrestres o 1000 cm3/ha para el caso de aplicaciones aéreas.

Información General:

Es un fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica, especialmente recomendado para el control prolongado de las enfermedades de los cereales, en especial, las manchas foliares, oídios y royas. Debido al modo de acción del trifloxistrobin y del propiconazole, puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.
Trifloxistrobin tiene una actividad mesostémica caracterizada por una afinidad con la superficie de la planta, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar. Trifloxistrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorias en la epidermis del tejido vegetal.
Propiconazole es incorporado a la planta y transportado por el xilema. Actúa sobre los hongos patógenos dentro de la planta, luego de la formación de la primera haustoria de los mismos. Detiene el crecimiento del hongo interfiriendo la biosíntesis de sus membranas celulares y consecuentemente detiene el crecimiento del hongo.

Preparación:
Agregar agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de la capacidad, poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida del producto al tanque y continuar con la agitación, completando el llenado del tanque con agua.

Técnicas y equipos de aplicación:
Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
El producto puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
El volumen de la aplicación debe ser de 150 - 200 l/ha de agua, trabajando con una presión de 60 lb/pulg2 para lograr un buen mojado de las plantas.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de 20 - 40 l/ha. Se recomienda no aplicar con humedad relativa menor al 60%, temperaturas mayores a 29°C y viento superior a 10 km/h.
No realizar las aplicaciones en las horas de mayor calor del día; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe la posibilidad de una lluvia inminente.

Condiciones y advertencias especiales:
NO aplicar el producto cuando el cultivo esté bajo condiciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas o heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

NO aplicar el producto, si se espera una lluvia inminente, ya que el control puede ser insatisfactorio.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 12,5% + 12,5%:
DL50 oral aguda para ratas: > 2000 mg/kg
DL50 dermal aguda para ratas: > 4000 mg/kg

Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales: es muy tóxico para peces, por lo que se recomienda tener especial cuidado a fin de evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contamine el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contamine estanques ni cursos de agua.
Es prácticamente no tóxico para aves.

Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
STRATEGO	BAYER	33646	EC	12,5% + 12,5%	III