TRIFLOXISTROBIN + CIPROCONAZOLE

Marcas comerciales: RUEDA - SPHERE MAX.

Nomenclatura Química:
trifloxistrobin: metoximino-{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino-oximetil]-fenil}-metiléster del ácido acético
ciproconazole: 2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(IH-1,2,4-triazol-1-il)-butano-2-ol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Avena común Cebada	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Oídio del trigo (*Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	300 - 400 cm3/ha (*)	35	En variedades susceptibles, cuando ocurran condiciones predisponentes, aplicar de forma preventiva. En variedades tolerantes, al inicio de la aparición de la enfermedad. Cuando la planta está en estado de hoja bandera y la incidencia de la enfermedad en la hoja inferior llega al 10%.
Maíz	Helmintosporiosis común (*Exserohilum turcicum)* Roya común (*Puccinia sorghi)*	250 - 400 cm3/ha	60	Aplicar cuando aparecen las primeras pústulas estando la octava hoja totalmente expandida (V8) hasta panojamiento (R1). Utilizar la dosis mayor a mayor presión de enfermedad. Aplicar con Coadyuvante Optimizer: 0,5 L/ha en aplicaciones aéreas de caudales entre 20 y 25 litros/ ha, y 0,3 L/ha en aplicaciones terrestres de caudales entre 100 y 150 litros/ha. En caso de utilizar caudales de aplicación menores a los detallados en el punto anterior en aplicaciones terrestres, utilizar el Coadyuvante Optimizer a razón del 0,2% en volumen. Utilizar la dosis de 250 cm3/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, híbridos más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 400 cm3/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, híbridos altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades.
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	200 - 250 cm3/ha	15	Aplicar ante la presencia de las primeras manchas y de acuerdo a condiciones predisponentes. Repetir las aplicaciones en caso que las mismas persistan; con intervalos de 21 a 28 días.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)*	100 cm3/ha	20	Ante la observación temprana de síntomas de la enfermedad entre los períodos de Vn hasta R1 y en variedades de media a alta susceptibilidad, se recomienda aplicar 100 cm3/ha en el mencionado período vegetativo, con la complementación de 150 cm3/ha para el período reproductivo en el momento que se vuelvan a presentar nuevos síntomas de la enfermedad y siempre con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas.
	Antracnosis de la soja (*Colletotrichum glycines)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Quemado de la hoja (*Diaporthe phaseolorum var. sojae)*	150 cm3/ha		Una sola aplicación entre los estados R3 (Inicio de formación de vainas) y R5 (Máximo tamaño de las mismas), cuando se observen los primeros síntomas en función a los umbrales existentes para cada enfermedad y con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas. Aplicar con Coadyuvante Optimizer: 0,5 l/ha en aplicaciones aéreas y 0,3 l/ha en aplicaciones terrestres.
	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)*			
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas. En caso de condiciones ambientales no favorables de alta temperatura y baja humedad relativa, aplicar aceite mineral agrícola a razón de 500 cm3/ha en aplicaciones terrestres y 1 litro en aplicaciones aéreas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Oídio del trigo (*Erysiphe graminis f. sp. tritici)* Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)*	250-400 cm3/ha	35	Utilizar la dosis de 250 cm3/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades.

	Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*			Utilizar la dosis de 300 cm3/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones intermedias de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades. Utilizar la dosis de 400 cm3/ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades. Aplicar con Coadyuvante Optimizer: 0,5 l/ha en aplicaciones aéreas de caudales entre 20 y 25 l/ha, y 0,3 l/ha en aplicaciones terrestres de caudales entre 100 y 150 l/ha. En caso de utilizar caudales de aplicación menores a los detallados en el punto anterior en aplicaciones terrestres, utilizar el Coadyuvante Optimizer a razón del 0,2% en volumen. En caso de utilizar caudales de aplicación menores a los detallados en el punto anterior en aplicaciones aéreas, utilizar el Coadyuvante Optimizer a razón del 2% en volumen.

(*) En variedades susceptibles y ante condiciones climáticas favorables se recomienda usar la dosis mayor.
Repetir la aplicación a las 3 a 5 semanas si la presión de la enfermedad continúa o una nueva enfermedad aparece.
En caso de presentarse condiciones predisponentes para Fusarium, aplicar tebuconazole en forma preventiva.

Información General:

Es un fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica, especialmente recomendado para el control prolongado de las enfermedades de los cereales, en especial royas, oídio y manchas foliares. Mantiene por más tiempo el cultivo sano y verde, con el consecuente mejoramiento en el rendimiento final por un mayor llenado de grano.

El producto es absorbido rápidamente por hojas y tallos verdes, y es redistribuido por toda la planta. Posee efecto residual de protección del cultivo.

Trifloxistrobin tiene una actividad mesostémica caracterizada por una alta afinidad con la superficie de la planta, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar. Trifloxistrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal.

Ciproconazole es incorporado a la planta y distribuido en forma ascendente. Actúa sobre los hongos patógenos durante la penetración y formación de haustorios. Detiene el crecimiento del hongo interfiriendo la biosíntesis de sus membranas celulares. Tiene una acción preventiva y fuertemente curativa.
Debido entonces al modo de acción del trifloxistrobin y del ciproconazole, puede ser utilizado en forma preventiva o curativa.

Puede ser recomendado en un "Programa de Manejo Integrado de Plagas".

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Producto formulado 37,5% + 16%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 1,962 mg/l
Ingesta diaria admisible (IDA) para humanos: 0,022 mg/kg/día

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales: es extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos, por lo que se recomienda tener especial cuidado a fin de evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contamine el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contamine estanques ni cursos de agua. Es prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para las abejas.
Irritante ocular. Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada y protector facial durante la preparación y/o aplicación. Aplicar tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RUEDA	BAYER	37073	SC	37,5% + 16%	III
SPHERE MAX	BAYER	34806	SC	37,5% + 16%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.