TRIFLURALINA

Marcas comerciales: ADAMA ESSENTIALS PREMERGE.

Nomenclatura Química:
trifluralina: alfa, alfa, alfa -trifluoro - 2,6 - dinitro - N,N - dipropil - p - toluidina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: dinitroanilina.
Acción: residual.

Uso: herbicida (pre-siembra).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Avena *(Avena spp.)* Brachiaria plantaginea (*Brachiaria plantaginea)* Cadillo (*Cenchrus pauciflorus)* Capín o pata de gallo (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cebadilla (*Bromus unioloides)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Colas de zorro (*Setaria viridis)* Corregüela *(Convolvulus* spp) Grama carraspera *(Eleusine indica)* Leptochloa o triguillo *(Leptochloa spp.)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga *(Urtica urens)* Paja voladora (*Panicum bergii)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto hediondo (*Eragrostis spp.)* Pasto puna *(Stipa brachychaeta)* Pasto valcheta *(Bromus secalinus)* Poa (*Poa annua)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Roseta francesa *(Tribulus terrensis)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verdolaga alfombra *(Mollugo verticilata)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	PC 60%: 1,0 - 2,0 l/ha	30	En el período de receso o luego de un corte: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha.
Frutales		PC 60%: 1,0 - 2,0 l/ha		Pre-plantación: en plantaciones establecidas carpir previamente sin dañar las plantas: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha.
Gladiolo				Desde 6 semanas antes de la siembra. Bulbos pequeños (< 2,5 cm) pueden ser dañados: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha.
Hortalizas				Siembra directa: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,2 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 1,5 l/ha. Desde 4 semanas antes de la siembra. Trasplante: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha. Post-emergencia: Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha. Después del raleo con plantas de 5 - 15 cm de altura.
Maní		PC 60%: 1,0 - 1,2 l/ha		Desde 4 semanas antes de la siembra. Aplicar en presiembra incorporado. Suelos livianos: PC 60%: 1 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,2 l/ha.
Oleaginosas		PC 60%: 1,0 - 2,0 l/ha		Desde 4 semanas antes de la siembra. Aplicar en presiembra incorporado. Suelos livianos: PC 60%: 1,0 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha.
		PC 60%: 2,0 - 3,5 l/ha		Sin incorporar: Suelos livianos: PC 60%: 2 l/ha Suelos medianos: PC 60%: 3 l/ha Suelos pesados: PC 60%: 3,5 l/ha
Tabaco		PC 60%: 1,5 - 2,0 l/ha		Antes del trasplante, desde 4 semanas. Suelos livianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos medianos: PC 60%: 1,5 l/ha. Suelos pesados: PC 60%: 2,0 l/ha.
Árboles, arbustos		PC 60%: 1-2 l/ha		Suelos livianos: 1 l/ha Suelos medianos: 1,5 l/ha Suelos pesados: 2 l/ha

Información General:

Trifluralina al 60%: es un herbicida selectivo y pre-emergente que tiene acción contra las malezas indicadas, en aplicaciones sin incorporación por su especial formulación, la que no se volatiliza ni es degradada por rayos solares (ultravioletas). Lluvias posteriores a la aplicación ayudan en su incorporación mejorando su desempeño.
Si se desea puede incorporarse al suelo. Para ello debe ser aplicado desde 4 semanas antes de la siembra hasta el mismo momento de la siembra. Luego de la aplicación se incorpora mediante labores culturales a una profundidad de 5 a 10 cm utilizando

rastras de discos o cultivadores rotativos para que el producto quede distribuido homogéneamente en el suelo. No tiene acción sobre malezas ya emergidas.

Equipos de aplicación: utilizar con equipos terrestres provistos de barra con pastillas tipo abanico plano que arrojen un volumen de agua de 100 - 400 l/ha. Presión: 30 - 40 lb/pulg2.

Compatibilidad: es compatible en mezclas de tanque con flumetsulam.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 60%:
DL 50 oral aguda en rata: > 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 5000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria aguda: > 22,85 mg/l

Irritante ocular y dermal. Sensibilizante dermal.

Antídoto: no posee antídoto específico.

Riesgos ambientales:
ligeramente tóxico para abejas. Prácticamente no tóxico para aves. Muy tóxico para peces y organismos acuáticos. Evitar contaminar cuerpos y cursos de agua (mantener una distancia mínima de 20 m entre el area tratada y el cuerpo de agua)

En caso de ingestión: no inducir el vómito, contiene solvente aromático. Llamar a un médico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA ESSENTIALS PREMERGE	ADAMA ARGENTINA SA	32779	EC	60%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.