TRIFORINE

Nomenclatura Química:
triforine: N,N'(1,4-piperacinadil-bis-(2,2,2-tricloroetiliden) bis(formamida).
Clasificación Química: piperazima.
Acción: preventiva, curativa y sistémica local.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Clavel	Roya del clavel (*Uromyces dianthi)*	PC 19%: 75 - 150 cm3/hl	N/C	Aplicar desde que se observan los primeros signos de la enfermedad. En caso de fuerte ataque se pulverizará con intervalos de 1 a 2 semanas. Triforine no es fitotóxico en hojas y flores de diversas plantas ornamentales, pero dada la sensibilidad de estas plantas, se recomienda realizar una aplicación de prueba antes de hacer un tratamiento total. Consultar con un ingeniero agrónomo.
Crisantemo	Oídio del crisantemo (*Oidium chrysanthemi)* Roya del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi)*			
Duraznero	Podredumbre morena de los frutales (*Monilinia fructicola)* Sarna (*Cladosporium carpophilum)*	PC 19%: 120 - 125 cm3/hl	14	Primer tratamiento: a la aparición de las flores. Segunda aplicación: con frutitos de 1 cm de diámetro.
Manzano	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*			Primera aplicar a botón rosado. Segunda aplicar a la caída de las 3/4 partes de los pétalos. Tercera aplicar 15 - 20 días después.
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*			Según indicaciones del servicio de alarma.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)*	PC 19%: 200 cm3/hl	8	Primera pulverización: a los 30 - 45 días de la siembra, apenas se formaron las hojas verdaderas. Segunda pulverización: a los 60 días de la siembra. Emplear 2 litros de triforine por hectárea.
	Oídio del poroto (*Oidium balsami)* Roya del poroto (*Uromyces appendiculatus)*	PC 19%: 150 cm3/hl		Primera aplicación: cuando aparezcan los signos de la enfermedad. Segunda aplicación: 10 días después. Emplear como mínimo 1,5 litros de triforine por hectárea.
Rosales	Oídio del rosal (*Oidium leucoconium var. rosae)* Roya del rosal (*Phragmidium mucronatum)*	PC 19%: 75 - 150 cm3/hl	N/C	Aplicar desde que se observan los primeros signos de la enfermedad. En caso de fuerte ataque se pulverizará con intervalos de 1 a 2 semanas. Triforine no es fitotóxico en hojas y flores de diversas plantas ornamentales, pero dada la sensibilidad de estas plantas, se recomienda realizar una aplicación de prueba antes de hacer un tratamiento total. Consultar con un ingeniero agrónomo.
Vid	Oídio de la vid (*Oidium tuckeri)*	PC 19%: 120 - 125 cm3/hl	14	Primera aplicación: con brotes de 15 a 20 cm de largo. Segunda aplicación: en floración. Tercera aplicación: 30 días después de la segunda.
Zapallo criollo	Oídio del zapallo (*Oidium erysiphoides)*	PC 19%: 150 cm3/hl	8	Comenzar los tratamientos al observar los primeros signos de la enfermedad y continuar cada 1 - 2 semanas, de acuerdo con la gravedad del ataque. Emplear 1,5 litros de triforine por hectárea.

Información General:

Preventivamente inhibe la germinación de las esporas, curativamente impide la formación de los órganos de fijación y absorción de los hongos.
Está dotado de un efecto reductor sobre los ácaros.
Se presenta bajo la forma de un sólido cristalino blanco inodoro.
No tiene persistencia en el suelo.

Restricciones de uso: No aplicar triforine sobre la variedad Golden Delicious.

Equipo de aplicación: puede emplearse cualquier máquina pulverizadora pero preferentemente con agitadores. Efectuar un mojado completo de las plantas, pulverizando hasta punto de goteo.

Compatibilidad: puede mezclarse con herbicidas hormonales, urea e insecticidas formulados como líquidos emulsionables. No se recomienda hacer mezclas para tratar cultivos ornamentales, debido a su diferente susceptibilidad.
Los funguicidas en general, en forma de polvos mojables y dispersiones, no son compatibles con triforan, solamente se puede mezclar con fungicidas a base de benzimidazoles (benomil, metiltiofanato y otros).

Fitotoxicidad: No se observan casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: > 6600 mg/kg (rata).
DL50 dermal aguda: > 2500 mg/kg (rata).
LC50 inhalación: > 37.8 mg/l (rata).

Irritación dermal: no irritante.
Irritación ocular: leve irritante
No sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales: virtualmente no tóxico para abejas, prácticamente no tóxico en aves y ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos. No contaminar cursos ni fuentes de agua.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener mayor información, previo a su uso, consulte la etiqueta del producto y/o recurra a su asesor profesional.