TRINEXAPAC - ETIL

Marcas comerciales: MODDUS.

Nomenclatura Química:
trinexapac-etil: éster etílico del ácido 4-(ciclopropil-alfa-hidroxi-metileno)-3,5-dioxociclohexanocarboxílico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ciclohexanodiona.
Acción: sistémica.

Uso: fitorregulador.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Caña de azúcar	600 - 800 cm3/ha	Aplicar 40 - 65 días antes de la cosecha. Aplicar al final del periodo de gran crecimiento, entre fines de marzo y primera semana de Mayo.
Cebada Trigo	300 a 500 cm3/ha	Con una aplicación se logra inhibir consistentemente el crecimiento de la planta, produciendo un acortamiento de los entrenudos, restringiendo su altura y la consiguiente reducción del vuelco de los cultivos de trigo y cebada de alta producción. Aplicar con el cultivo en un nudo (Zadoks 3.1). Ante condiciones predisponentes al vuelco del cultivo se recomienda usar la dosis mayor. NO aplicar cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés, tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas.
Raigrás	400 - 800 cm3/ha	Aplicar en cultivo de raigrás (Lolium multiflorum) para cosecha, en el primer nudo (Zadoks 3.1). Ante condiciones predisponentes al vuelco del cultivo (alta fertilidad, buena humedad, crecimiento vigoroso,etc.) se recomienda usar la dosis mayor. No se ha evaluado el uso para raigrás como cultivo de pastoreo.

Información General:

Regulador de crecimiento especialmente recomendado para evitar el vuelco de los cultivos de trigo y cebada de alta producción, caña de azúcar y raigras. Es absorbido principalmente por las hojas y tallos y traslocado a las zonas de actividad meristemática. Con una aplicación de se logra inhibir consistentemente el crecimiento de la planta, produciendo un acortamiento de los entrenudos, restringiendo su altura y la consiguiente reducción del vuelco.

Preparación:
Concentrado emulsionable en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad.
- Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa.
- Terminar de completar con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, provisto con un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. El volumen de aplicación deberá ser de 120-150 l/ha de caldo, trabajando con 4 bar (60 lb/pulg2) de presión para, lograr un buen mojado de las plantas. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Recomendaciones de uso:
Con una aplicación se logra inhibir consistentemente el crecimiento de la planta, produciendo un acortamiento de los entrenudos, restringiendo su altura y la consiguiente reducción del vuelco de los cultivos de trigo y cebada de alta producción. No aplicar el producto cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés, tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas.

Restricciones de uso:
Período de carencia: el principio activo trinexapac-etil se halla exento de período de carencia para el uso posicionado como regulador de crecimiento en trigo, cebada y como madurador en caña de azucar. Para el cultivo de raigrás dejar transcurrir 30 dias entre la última aplicación del producto y la cosecha.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotación de cultivos: no existen inconvenientes en los cultivos subsiguientes en la rotación posterior al tratamiento con trinexapac etil, debido a su rápida degradación en el suelo. En caso de pérdida de cultivos tratados con trinexapac etil, se puede resembrar inmediatamente sin inconvenientes.

NO aplicar trinexapac etil, cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés, tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: NO aplicar trinexapac etil en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo.
NO hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y condiciones de aplicación recomendadas en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Toxicidad aguda (del producto formulado):

Toxicidad oral aguda:	DL50: > 5000 mg/kg (ratas)
Toxicidad dermal aguda:	DL50: > 4000 mg/kg (Conejos)
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2,51 mg/L
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para las abejas.
Producto de bajo riesgo para artrópodos benéficos, lombrices, organismos nitrificadores y algas dulceacuícolas. Posee bajo impacto ambiental, persistencia o polución.
NO pastorear con animales áreas tratadas.
NO contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MODDUS	SYNGENTA AGRO	33640	EC	25%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.