Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

UREA FOSFATO

Nomenclatura Química:
Urea Fosfato.
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: reacción en el suelo.

Uso: fertilizante (foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Frutales	3 a 6 kg/ha	Después del cuaje repitiendo cada 25 a 35 días. No fertilizar en floración.
Hortalizas de fruto	2 a 6 kg/ha	Después de la floración hasta comienzo de cosecha. 3 a 6 aplicaciones.
Hortalizas de hoja	1,5 a 3,5 kg/ha	Cuando las plantas alcanzan 6 a 10 cm de altura. Repetir cada 15 días hasta comienzo de cosecha.
Ornamentales	2 a 4 kg/ha	Cuatro tratamientos espaciados cada 25 días. No fertilizar en floración.

Aplicar el producto con un volumen de 250 - 2000 litros de agua/ha según el desarrollo del cultivo.

Uso: fertilizante (fertirrigación).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Cultivos industriales	80 a 200 kg/ha	Concentración de agua de riego 0,4 a 0,6 (g/l).
Frutales (Carozo, pepita, citrus, vid)	100 a 250 kg/ha	Concentración de agua de riego 0,4 a 0,6 (g/l).
Hortalizas de bulbo (Ajo, cebolla, remolacha, zanahoria)	60 a 120 kg/ha (*)	Concentración de agua de riego 0,2 a 0,5 (g/l).
Hortalizas de fruto (Tomate, pimiento, berenjena,...)	80 a 200 kg/ha	Concentración de agua de riego 0,3 a 0,6 (g/l).
Hortalizas de hoja (Lechuga, espinaca, acelga,...)	60 a 120 kg/ha	Concentración de agua de riego 0,3 a 0,5 (g/l).

(*) En caso de cultivos bajo cubierta y según el nivel de rendimientos las dosis arriba mencionadas pueden llegar a duplicarse.

Información General:

Composición:
Nitrógeno total: 18,0%
Fósforo asimilable: 19,2%
Reacción en el suelo: altamente ácida.
Índice: 60
pH: 2,7

Grado: 18 - 19 - 0 Grado equivalente: 18 - 44 - 0

Se debe preparar una solución al 10% (10 Kg. en 100 litros de agua ó 25 Kg. en 250 litros de agua) y esta solución se diluye en el agua de riego. No deberá sobrepasar la concentración de 2 grs. de sal por litro.
La conductividad eléctrica del agua no deberá superar nunca 2 ds / metro (decisiemens por metro).

Aplicación:
Las dosis indicadas deben ser aplicadas con el agregado de 0,5 a 1,0% de un tensioactivo no polar, no iónico. Las dosis son indicativas, pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades de cultivo y el consejo del Ingeniero Agrónomo de la zona. No aplicar en tiempo caluroso ni en horas de gran insolación.
La fertilización foliar es un complemento de la fertilización de fondo (suelo). Es aconsejable realizar un análisis de suelo para una correcta dosificación.

Almacenamiento:
No dejar los envases abiertos porque se humedecen en contacto con el aire. Guardar las bolsas en lugar seco sobre tarimas sin entrar en contacto con el suelo. Asegurar ventilación adecuada del depósito. No almacenar con combustibles, productos corrosivos, o materiales orgánicos, teniendo en cuenta la precaución de no fumar. No almacenar a temperaturas mayores de 32º C por peligro de ignición e incendio.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.